Corso di birdwatching

Uccelli di pianura (0-199 mslm)

Top 101-150

L’ordine delle schede segue la frequenza di osservazione delle specie:
dalle più comuni fino a quelle via via meno comuni

18/6/2025

VENEZIA
BIRDWATCHING

Testi, disegni e foto (se non diversamente indicato) di
© Emanuele Stival

Gavina

- Becco abbastanza piccolo giallo verde con banda nera verso l'estremità
- Parti superiori grigie ala compresa con nero e bianco all'estremità
- Capo bianco (come le parti inferiori) con fini striature grigie
- Zampe giallo verdi
- Gregario
- Frequenta la campagna aperta e anche aree lagunari
- Migratore, svernante

Zigolo nero

- Becco tozzo grigiastro
- Capo giallo e nero (maschio)
- Parti inferiori grigio verde con banda sfumata di rosso (maschio)
- Femmina molto mimetica
- Solitario
- Volo abbastanza ondulato
- Frequenta zone cespugliate e con conifere
- Migratore, nidificante, svernante

Falco pellegrino

- Becco adunco
- Parti superiori di corpo e ala grigi, più scuri sul capo
- Parti inferiori, ali incluse, biancastri barrati di scuro (adulto) o striati (giovani)
- Grosso «baffo» sulle guance
- Ali appuntite e corpo massiccio
- Frequenta zone urbane aperte, rocciose anche in ambiente urbano
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

Adulto

Adulto

Giovane

Smergo maggiore

- Becco lungo rosso con «denti»
- Maschio con capo verde scurissimo e parti inferiori bianco rosate
- Femmina e maschio in abito eclissale con capo fulvo con ciuffo e gola bianca
- Maschio con parti superiori nerastre
- Si immerge per cercare cibo
- Volo diritto e veloce di solito basso
- Frequenta soprattutto zone umide lacustri
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

Averla piccola

- Becco robusto e uncinato
- Ali sopra e schiena castani
- Capo grigio con mascherina nera e groppone grigio
- Coda nera con timoniere esterne bianche
- Solitario
- Frequenta zone cespugliate
- Migratore, nidificante

♂

♀

Gru

- Becco abbastanza lungo e grigio
- Corpo e ali grigi (estremità ali nere)
- Campo bianco e nero con macchia rossa su vertice
- Immaturi con meno contrasti su collo e capo
- Volo con collo teso
- Gregario
- Frequenta zone aperte anche umide
- Migratore, svernante raro

Tordo bottaccio

- Becco discretamente robusto
- Parti superiori di corpo e ali marrone
- Parti inferiori e gola chiare con tipiche macchiettature scure a «freccia»
- Volo furtivo e abbastanza lineare
- Sottoala in zona ascellare arancione
- Frequenta zone alberate e siepi
- Migratore, nidificante, svernante

Assiolo

- Becco adunco
- Occhi giallo verdi
- Corpo e ali fulvo grigiastri
- Ciuffi auricolari assenti
- Solitario
- Volo abbastanza rapido e furtivo
- Frequenta zone alberate anche di conifere
- Migratore, nidificante

Pivieressa

- Becco nerastro non lungo
- Corpo marrone / grigio superiormente in abito invernale
- In abito estivo parti inferiori fino alla gola nere
- Barra alare bianca
- Volo abbastanza veloce
- Gregario
- Frequenta zone umide lagunari e litorali
- Migratore, svernante

Abito estivo

Abito invernale

Cicogna bianca

- Grande trampoliere che vola con colo e zampe distesi
- Colorazione bianca e nera

© Emanuele Stival

Marzaiola

♂♂♀

- Becco appiattito nerastro
- Maschio in abito nuziale con grande sopracciglio bianco
- Femmina mimetica con sopracciglio accennato e macchia chiara alla base del becco
- Barra alare verdastra bordata di bianco e ala in parte grigia nel maschio
- Volo diritto e abbastanza veloce
- Frequenta zone umide
- Migratore, nidificante localizzato

♀ a sinistra, ♂ a destra

Canapiglia

- Becco appiattito arancio e nero
- Entrambi i sessi molto mimetici, maschio con vermicolature evidenti e più grigiastro
- Barra alare bianca bordata di nero e marrone rossiccio
- Volo diritto e abbastanza veloce
- Gregario
- Frequenta zone umide
- Migratore, svernante, nidificante localizzato

♂

♀ a sinistra, ♂ a destra

Albanella reale

- Becco adunco
- Maschio con corpo grigio e ali grigie con ampie estremità nere
- Femmina mimetica con ali barrate
- Base della coda con banda bianca
- Volo non veloce basso (in caccia)
- Frequenta zone umide e campi aperti / incolti
- Migratore, svernante

Cannaiola verdognola

- Becco normale
- Corpo superiormente marrone un po’ sul grigio
- Sopracciglio abbastanza evidente
- Volo furtivo
- Solitario
- Canto caratteristico con imitazioni – FONDAMENTALE per il riconoscimento
- Frequenta zone umide con vegetazione ripariale
- Migratore, nidificante

Sterna zampenere

- Becco nero robusto a «pugnale»
- Corpo superiormente grigio e bianco con cappuccio nero sul vertice
- Gregario
- Volo lento
- Frequenta zone umide e campi aperti
- Migratore, nidificante raro

Adulto in abito invernale

Adulto in abito nuziale

Sgarza ciuffetto

- Becco con base chiara (o azzurra) e apice nero
- Cresta fulva striata di scuro
- Adulti con corpo fulvo dorato e ali bianche sporco di fulvo
- Zampe giallastre - verdastre
- Volo lento e diritto con collo a «S»
- Gregario in nidificazione
- Frequenta zone umide
- Migratore, nidificante

Immaturo / adulto in abito invernale

Adulto in abito nuziale

Piro piro culbianco

- Becco discretamente lungo, diritto e nerastro
- Corpo marrone scuro superiormente e bianco inferiormente
- Coda bianca con dense barrature marrone scuro
- Forte contrasto tra parti superiori e quelle inferiori (sottoala nerastro)
- Sopracciglio ben visibile solo davanti all'occhio
- Volo diritto e veloce
- Solitario
- Frequenta zone umide anche fossati
- Migratore, svernante

Cannareccione

- Becco normale
- Corpo superiormente marrone
- Sopracciglio abbastanza evidente
- Volo furtivo
- Solitario
- Canto caratteristico e ripetitivo
- Frequenta zone umide ricche di canneti
- Migratore, nidificante

Corriere piccolo

- Becco corto e nero
- Capo bianco e nero con bavaglio nero
- Femmina con colori più smorti del maschio
- Barra alare modestissima
- Volo veloce e con repentini cambi di direzione
- Frequenta zone umide
- Migratore, nidificante

Adulto in abito estivo

Giovane

Totano moro

- Becco lungo nero con base rosso arancio in mandibola inferiore
- Corpo superiormente marrone / grigio
- Nessuna banda alare
- Volo diritto e abbastanza veloce
- Frequenta zone umide
- Migratore, svernante

Abito nuziale

Abito invernale

Oca lombardella

- Becco rosa con base bianca
- Barre nere su addome (adulti)
- Gregario
- Volo abbastanza veloce e lineare
- Frequenta zone umide e campi aperti
- Migratore, svernante



Allodola

- Becco normale appuntito
- Corpo e ali sopra molto screziate di marrone
- Petto chiaro striato di scuro
- Bordo posteriore dell'ala bianco e timoniere esterne bianche
- Canto tipico molto variato
- Volo non veloce con lievi ondulazioni
- Frequenta zone aperte a prato
- Migratore, nidificante, svernante

Beccapesci

- Becco affusolato nero con punta gialla
- Vertice nero con piccolo ciuffo posteriore (in periodo riproduttivo)
- Superiormente grigio chiaro
- Volo un po' irregolare seguendo i battiti alari
- Gregario nidifica in colonie
- Frequenta zone umide soprattutto lagunari e mare
- Migratore, nidificante, svernante

Abito invernale

Balia nera

- Becco corto nero
- Parti superiori nere in alcuni maschi
- Femmine e alcuni maschi marron grigi sopra
- Barra alare bianca e timoniere esterne bianche
- Solitario
- Volo breve durante l'attività trofica
- Frequenta zone alberate con radure
- Migratore

Frosone

- Becco molto tozzo, robustissimo
- Corpo sopra marrone e ali nerastre
- Vertice fulvo e nuca grigia, nero attorno occhi e su bavaglino
- Ampia barra alare e due fasce bianche su schiena
- Coda con parte terminale bianca
- Solitario
- Volo un po' ondulato
- Frequenta zone alberate
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

Piro piro boschereccio

- Becco discretamente lungo, diritto e nerastro
- Corpo marrone scuro superiormente macchiettato di bianco
- Inferiormente biancastro a sfumare con macchiettature verso petto e gola
- Coda bianca con fitte barrature marrone scuro
- Basso contrasto tra parti superiori e quelle inferiori (sottoala macchiettato)
- Sopracciglio ben visibile davanti e dietro all'occhio
- Volo diritto e veloce
- Solitario
- Frequenta zone umide
- Migratore

Fanello

- Becco tozzo e grigiastro
- Schiena e ali sopra castano
- Maschio con capo grigio, rosso su petto e vertice
- Femmina senza rosso e sfumata di camoscio inferiormente (come maschio fuori dal periodo riproduttivo)
- Banda bianco grigio chiaro su ala scura
- Gregario in inverno
- Volo ondulato
- Frequenta zone aperte con arbusti e rocce
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

♂

Occhiocotto

- Becco nerastro
- Dorso grigio e cappuccio sul capo nero (maschio)
- Dorso marron e capo grigio (femmina)
- Coda bordata di bianco
- Canto caratteristico e non facile da vedere
- Volo «furtivo» e basso
- Frequenta zone cespugliate anche litoranee
- Sedentario, nidificante

♂

♀

Pettegola

- Becco lungo con base rosso arancio e punta nera
- Corpo superiormente marrone con screziature nere
- Banda alare bianca sul bordo posteriore
- Volo diritto e abbastanza veloce
- Frequenta zone umide specialmente salmastre
- Sedentario, nidificante, migratore

Cincia mora

- Becco nero
- Parti sopra ali e schiena grigi
- Capo nero con nuca e guance bianche (bavaglino nero esteso)
- Doppia macchiettatura bianca su ali
- Solitario
- Volo su brevi distanze furtivo
- Frequenta zone alberate soprattutto conifere
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

Strillozzo

- Becco robusto e corto
- Parti superiori marrone con striature scure
- Petto e parti inferiori striate di scuro
- Zampe rosato carnacino
- Canto caratteristico
- Solitario
- Volo non veloce
- Frequenta zone aperte con arbusti e cespugli sparsi
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

Nibbio bruno

- Becco adunco
- Ala perlopiù marrone ruggine (anche addome) e aree più chiari alla base delle remiganti
- Coda forcuta (non sempre ben visibile)
- Capo grigiastro
- Solitario
- Volo lento
- Frequenta zone aperte e alberate spesso vicino a laghi
- Migratore, nidificante

Fischione

- Becco allargato azzurro con apice nero
- Maschio con capo rosso mattone e vertice giallo dorato
- Femmina mimetica
- Barra alare ampia bianca e nera (maschio)
- Volo diritto e abbastanza veloce
- Frequenta zone umide soprattutto salmastre e mare
- Migratore, svernante

♂

♀



Cesena

- Becco discretamente robusto
- Schiena e ali sopra marrone / grigio
- Capo e groppone grigi (più chiaro il groppone)
- Parti inferiori e gola bianco e fulvo con macchiettature scure
- Volo lineare
- Tipico verso «sciac»
- Sottoala in zona ascellare bianco
- Frequenta zone alberate e siepi con prati
- Migratore, svernante, nidificante

Fraticello

- Becco affusolato giallo con punta nera
- Vertice nero con fronte bianca
- Superiormente grigio chiaro, zampe gialle
- Volo un po’ irregolare seguendo i battiti alari
- Gregario nidifica in colonie
- Frequenta zone umide soprattutto lagunari, vallive e litorali
- Migratore, nidificante

Picchio muratore

- Becco un po’ allungato e grigio-nero
- Parti superiori marrone grigie, gola bianca
- Parti inferiori rosato - arancio
- Lunga stria nera attraverso l’occhio e fino alla nuca
- Solitario, spesso scende a testa in giù i tronchi degli alberi
- Volo veloce e dritto
- Frequenta aree con alberi maturi
- Sedentario, nidificante, migratore

Luì verde

Luì grosso

Cornacchia nera

- Becco robusto e nero
- Corpo e ali nere
- Volo con battute d'ala «dolci»
- Frequenta zone aperte e boscate
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

Gufo comune

- Becco adunco
- Corpo e ali fulvo marrone chiaro screziato di scuro
- Occhi rosso aranco
- Ciuffi auricolari molto evidenti
- Solitario ma gregario nei roost
- Volo «vellutato»
- Frequenta zone aperte con arbusti e alberature
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante



Cappellaccia

- Becco abbastanza robusto
- Parti superiori marrone con modeste screziature
- Ciuffo piuttosto «curvo» sul vertice
- Zampe rosate e coda con timoniere esterne arancioni
- Solitario
- Verso e canto tipici
- Volo non veloce abbastanza diritto
- Frequenta zone aperte con poca vegetazione
- Sedentario, nidificante

Topino

- Becco piccolo e nero
- Banda marrone sul petto e restanti parti inferiori bianche
- Superiormente marrone
- Volo con variazioni di direzione
- Frequenta zone umide
- Migratore, nidificante raro

Combattente

Maschio (sx) e femmina

Stiaccino

- Sopracciglio molto evidente, specie nei maschi
- Tipico di tutte le quote
- Sta spesso posato bello in vista sopra un punto elevato della vegetazione erbacea / cespugliata

Spatola

© Emanuele Stival

2013 © Emanuele Stival
www.emanuelestival.eu

Albanella minore

- Becco adunco
- Maschio con corpo grigio e ali grigie con ampie estremità nere
- Barra alare nera
- Femmina mimetica con ali barrate
- Base della coda con piccola banda bianca
- Ali abbastanza appuntite
- Volo non veloce
- Frequenta zone umide e campi aperti / incolti
- Migratore, nidificante raro

Giovane

♂

♀

Quaglia

- Uccello terricolo molto difficile da vedere, sta spesso nascosto nella vegetazione erbacea
- Colorazione bruna, canto caratteristico

Ghiandaia marina

Mignattino comune

- Becco nero appuntito
- Corpo sopra grigio e capo e petto-addomi neri (ad nuz)
- In abito inv. bianco sotto con capo vertice nero e «spallina» nerastra
- Volo non veloce e irregolare
- Frequenta zone umide anche lagunari
- Migratore

Adulto in abito nuziale

Adulto in abito invernale

Pendolino

- Becco piccolo ed esile azzurrognolo
- Capo grigio con ampia mascherina nera
- Dorso fulvo
- Solitario
- Volo piuttosto intermittente e non veloce
- Frequenta zone umide specie con canneti e tifeti
- Migratore, svernante

Adulto

Giovane