Corso di birdwatching

Uccelli di pianura (0-199 mslm)

Top 50

L’ordine delle schede segue la frequenza di osservazione delle specie:
dalle più comuni fino a quelle via via meno comuni

18/6/2025

VENEZIA
BIRDWATCHING

Testi, disegni e foto (se non diversamente indicato) di
© Emanuele Stival

Merlo

- Becco giallo-arancio
- Maschio nero e femmina marrone scuro
- Saltella, posizione parallela al suolo
- Solitario o in piccoli numeri
- Volo diritto e basso
- Frequenta zone urbane e campagna
- Sedentario, nidificante

♀

♂

Colombaccio

- Becco rosato
- Corpo con testa «piccola» quasi tutto grigio con terminali alari e bordo coda neri
- Banda a falce bianca sulle ali e bianco su collo
- Gregario
- Frequenta la campagna
- Sedentario, nidificante

Gazza

- Becco robusto e nero
- Corpo bianco e nero
- Volo lento con battiti irregolari
- Verso caratteristico
- Frequenta zone urbane e campagna
- Sedentario, nidificante

Cornacchia grigia

- Becco robusto e nero
- Corpo nero e grigio
- Volo diritto e «pesante»
- Gregario
- Frequenta zone urbane, suburbane e campagna
- Sedentario, nidificante

Cinciallegra

- Testa e gola nere con guance bianche
- Parti inferiori giallo limone con stria nera centrale più ampia sul ventre nel maschio
- Volo non veloce e «intermittente»
- Barra alare bianca visibile anche da posata
- Frequenta zone urbane, suburbane e campagna alberata
- Sedentario, nidificante

♂



♀

Tortora dal collare

- Corpo prevalentemente beige e marrone
- Collare nero su retro collo
- Zona grigio sfumata su ali e coda con bordo grigio
- Volo diritto e colpi d’ala energici
- Frequenta zone urbane e campagna
- Sedentario, nidificante

Gabbiano reale

- Becco robusto giallo con macchietta rossa verso l'estremità
- Ali e dorso superiormente grigio, il resto bianco
- Terminali alari neri con macchie bianche
- Anello attorno all'occhio rosso
- Frequenta litorali, mare, lagune, aree urbane, campagne
- Sedentario, nidificante

giovane

Storno

- Becco giallo roseo
- Nero con macchiettatura bianca in inverno
- Cammina, posizione eretta
- Gregario forma stormi numerosi
- Volo diritto con brevi pause ad ali chiuse
- Frequenta zone urbane e campagna
- Sedentario, nidificante

Abito invernale

Abito nuziale

Fringuello

- Becco piuttosto tozzo, robusto e appuntito
- Maschio con capo rosso mattone e vertice e nuca grigi
- Petto e gola neri – guance bianche
- Barre alari bianche
- Volo ondulato
- Gregario
- Frequenta zone boschive con alti alberi e campagna in inverno
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

♂

♀

Germano reale

- Maschio con capo verde scuro e collarino bianco, becco giallo verde
- Corpo grigio marron (maschio) e marrone screziato (femmina)
- Petto e gola neri – guance bianche
- Specchio alare blu bordato di bianco
- Volo diritto e veloce, si invola senza rincorsa
- Si ciba senza tuffarsi
- Coda arricciata nel maschio
- Frequenta zone umide
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

♂ ♀



Garzetta

- Becco lungo e appuntito nero
- Corpo bianco con egrette su capo e dorso in abito riproduttivo
- Becco nero, zampe nere con piede giallo
- Colo tenuto a «S» in volo
- Volo piuttosto lento
- Gregario
- Frequenta zone umide
- Migratore, nidificante, svernante

Abito non riproduttivo o immaturo

Pettirosso

- Becco nerastro, piccolo
- Corpo e ali superiormente marrone.
- Faccia, collo anteriormente e petto arancioni
- Canta anche in autunno e inverno
- Volo furtivo
- Solitario
- Frequenta zone boschive e d'inverno anche parchi e giardini
- Migratore, svernante, nidificante

Airone cenerino

- Becco lungo ed appuntito
- Capo con grande stria nera che termina in un ciuffo appuntito sulla nuca
- Corpo prevalentemente grigio con collo striato di bianco e nero
- Ali grigie e nere
- Colo tenuto a «S» in volo
- Volo lento con battiti lenti
- Gregario
- Frequenta zone umide di vario tipo
- Migratore, nidificante, svernante

Picchio verde

- Becco appuntito e robusto
- Corpo in prevalenza verde più chiaro sotto con groppone giallo-verde
- Vertice rosso e stria nera attorno e sotto l'occhio (con del rosso al centro nel maschio)
- Solitario
- Volo ondulato
- Frequenta la campagna alberata
- Sedentario, nidificante

♀

♂

Gheppio

- Becco adunco giallo e nero
- Corpo marrone superiormente e beige inferiormente macchiettati
- Capo grigio (pulito nel maschio) con mustacchio nero
- Ali abbastanza appuntite e macchiettate
- Solitario
- Volo diritto e fa spesso lo «spirito santo»
- Frequenta la campagna alberata
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

♂

♀

Capinera

- Becco sottile e nerastro
- Corpo grigio - marrone
- Vertice nero nel maschio e castano nella femmina
- Volo abbastanza diritto
- Frequenta zone urbane, suburbane e campagna
- Migratore, nidificante, svernante

♂

♀

Gabbiano comune

- Becco rosso
- Ali e corpo superiormente grigi con bianco all'estremità della coda
- Aree nere e bianche alle estremità alari
- Testa marrone (in abito nuziale) con bianco attorno all'occhio
- Gregario
- Frequenta zone urbane e campagna
- Sedentario, nidificante, migratore e svernante

Adulto in abito nuziale

Giovane

Adulto in abito invernale

Adulto in abito nuziale

Ghiandaia

- Becco tozzo e robusto
- Corpo prevalentemente marrone rossiccio
- Groppone bianco e area celeste e nera nell'ala
- Volo diritto, lento e con battiti «dolci»
- Frequenta zone suburbane e campagna
- Sedentario, nidificante

Rondine

- Becco piccolo ma ampio
- Parti superiori neri con riflessi azzurri, gola e alto petto rosso scuro
- Parti inferiori bianche sporche di arancio rosato (talvolta intensi)
- Coda molto lunga, specie nel maschio, e forcuta
- Frequenta zone suburbane e campagna
- Migratore, nidificante

♂

Cormorano

- Becco tozzo e robusto
- Corpo nero negli adulti (giovani più sul marrone e chiari sull'addome)
- In abito nuziale macchia chiara su coscia, gola e spruzzature su testa e collo
- Gregario
- Volo diritto e pesante
- Frequenta zone umide e mare
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

Giovane





Marangone minore

- Becco medio e nerastro
- Corpo nero negli adulti (giovani più sul marrone e chiari sull'addome)
- Capo sfumato di rossiccio, coda lunga e arrotondata
- Gregario
- Volo diritto e pesante con battiti abbastanza veloci
- Frequenta zone umide
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

Giovane

Gallinella d’acqua

- Becco piuttosto tozzo, rosso fino alla fronte e giallo (adulto)
- Corpo marrone nero con pennellature bianche sui fianchi e sottocoda
- Si immerge solo in caso di pericolo
- Preferisce camminare che volare
- Frequenta zone umide compresi fossi
- Sedentario, nidificante, migratore e svernante

Giovane

Poiana

- Becco adunco
- Corpo marrone superiormente e molto variabile inferiormente
- Banda più chiara sul petto spesso evidente
- Petto e gola neri – guance bianche
- Barra alare bianca
- Frequenta zone urbane e campagna
- Sedentario, nidificante

Soggetto molto chiaro

Picchio rosso maggiore

- Becco tozzo e robusto
- Corpo bianco e nero con sottocoda rosso
- Macchia rossa sulla nuca nel maschio
- Ali nere macchiettate di bianco
- Volo ondulato
- Frequenta la campagna alberata
- Sedentario, nidificante

♀



♂

Airone guardabuoi

- Becco non molto lungo, giallo (nero nei giovani) e appuntito
- Corpo bianco con petto, dorso e capo parzialmente fulvi in periodo riproduttivo
- Zampe da gialle a nere sui piedi
- Volo piuttosto lento con battiti non lenti
- Gregario
- Frequenta zone di campagna spesso seguendo i trattori
- Migratore, nidificante, svernante

Giovane

Passera d'Italia

- Becco tozzo e robusto
- Vertice, collo e parte della schiena marroni
- Petto e gola neri – guance bianche
- Barra alare bianca
- Volo con battiti a «intermittenza»
- Frequenta zone urbane e campagna
- Sedentario, nidificante

♀



♂

Codibugnolo

- Becco corto e nero
- Colorazione superiormente bianco / nera con riflessi rosati
- Parti inferiori chiare rosate
- Volo sfarfallante e lento
- Gruppi familiari in periodo extrariproduttivo
- Frequenta zone suburbane e campagna
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

Piccione di città

- Colori di piumaggio molto variabili
- Barre alari nere e spesse frequentemente presenti
- Gregario
- Frequenta zone urbane, suburbane e campagna
- Sedentario, nidificante

Folaga

- Becco bianco con placca frontale bianca
- Corpo nero con piccola area grigia su ala (visibile in volo)
- Si tuffa per cibarsi
- Gregario
- Volo diritto e teso
- Frequenta zone umide
- Sedentario, nidificante, migratore e svernante

Giovane

Luì piccolo

- Becco piccolo e sottile, nerastro
- Corpo marrone verdastro più chiaro sotto
- Sopracciglio chiaro abbastanza evidente
- Solitario
- Volo «incerto»
- Frequenta zone alberate e parchi in inverno anche in pianura
- Migratore, invernale, nidificante

Usignolo di fiume

- Becco non lungo e un po' arcuato
- Colore del corpo e ali marroni, molto più chiaro inferiormente
- Sopracciglio abbastanza evidente
- Molto facile da sentire il canto, molto difficile vederlo
- Tiene spesso la coda verso l'alto
- Frequenta zone umide con vegetazione ripariale
- Sedentario, nidificante

Verzellino

- Becco piccolo e tozzo
- Maschio con molto giallo su capo e petto-addome
- Parti superiori marrone striato
- Barre alari poco visibili
- Volo ondulato
- Frequenta zone urbane e campagna
- Sedentario, nidificante, migratore

♂

♀

Cigno reale

- Corpo e ali completamente bianchi
- Becco arancio con area nuda nera davanti agli occhi e sopra il becco
- Volo diritto e veloce con tipico fischio, si invola con rincorsa
- Si ciba senza tuffarsi
- Frequenta zone umide
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

Airone bianco

- Becco lungo e appuntito giallo (ma anche nero)
- Corpo e ali bianche
- Mancanza di egrette sul capo
- Zampe gialle alla base e poi nere (ma anche rosse)
- Colo tenuto a «S» in volo
- Volo lento con battiti lenti
- Frequenta zone umide
- Migratore, svernante

Colorazione inconsueta

Rondone comune

- Corpo marrone scuro con sola macchia bianca sulla gola
- Ali a falce appuntite
- Volatore perfetto, si posa solo per nidificare
- Frequenta zone urbane e suburbane
- Migratore, nidificante

Ballerina bianca

- Gola e vertice neri, fronte e guance bianche
- Parte inferiori bianche e superiori grigie con barra alare bianca
- Volo ondulato
- Frequenta zone urbane, suburbane e campagna
- Sedentario, nidificante

Scricciolo

- Becco sottile un po’ arcuato verso il basso
- Corpo marrone screziato di scuro
- Ali simili al corpo ma con anche screziature bianche
- Tiene spesso la coda all’insù
- Volo basso e furtivo
- Solitario
- Frequenta zone cespugliate, parchi e giardini
- Sedentario, nidificante

Svasso maggiore

- Becco lungo e appuntito
- Corpo marrone rosato sopra e biancastro sotto
- Collo lungo bianco e nero dietro
- Ciuffi auricolari rossicci sfumati al nero (solo abito nuziale)
- Ali con ampie aree bianche davanti e dietro l'ala
- Volo diritto e veloce
- Si immerge per cibarsi
- Frequenta zone umide profonde e mare
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

Abito nuziale



Abito invernale

Cinciarella

- Becco tozzo e piccolo
- Parti inferiori gialle con sottile stria centrale su addome nerastra
- Capo bianco con stria nera su occhio e vertice+nuca azzurri
- Bavaglino nero
- Volo un po' tintinnante
- Frequenta zone con alberature non troppo dense
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

Usignolo

- Becco normale e un po’ appuntito
- Corpo marrone superiormente e bianco sporco inferiormente
- Facile sentire il canto (anche notturno) ma difficile da vedere
- Frequenta la campagna alberata e siepi folte
- Migratore, nidificante

Fagiano comune

- Becco chiaro, robusto e un po' arcuato
- Corpo prevalentemente marrone rossiccio screziato (femmina molto mimetica)
- Capo nerastro con riflessi metallici e collare bianco
- Pelle nuda rossa con bargigli ai lati del capo del maschio
- Frequenta la campagna
- Sedentario, nidificante

♂

♂

♀

Tuffetto

- Becco abbastanza corto e nerastro
- Corpo nerastro con guance e nuca castani in abito nuziale
- Macchia gialla alla base del becco
- Banda alare bianca sfumata
- Si tuffa per cibarsi anche in acque poco profonde
- Frequenta zone umide
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

Abito nuziale

Abito invernale



Martin pescatore

- Becco lungo e nero nel maschio; base inferiore arancione nella femmina
- Corpo e ali superiormente blu, azzurro e verdastro
- Arancione le restanti parti inferiori
- Volo teso e rapido radente l'acqua
- Lati nuca e gola bianchi (macchiette bianche su ali e vertice)
- Si tuffa da posatoio per catturare la preda
- Frequenta zone umide
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

♂

♀

Falco di palude

- Becco adunco
- Superiormente marrone, nero, crema, grigio nel maschio
- Addome e ventre marroni, testa chiara striata (maschio)
- Femmina marrone scuro con capo e parte sulle ali crema
- Caccia volando con ali a «V», volo lento
- Frequenta zone umide
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

♂

♂

In caccia



Giovane

Verdone

- Becco tozzo e grosso
- Corpo prevalentemente verdastro
- Bordi coda e grandi barre alari gialli
- Volo ondulato
- Frequenta zone urbane e campagna
- Migratore, invernale, sedentario, nidificante

♂

♀

Cardellino

- Becco robusto, appuntito e chiaro
- Parti superiori fulve con groppone chiaro, capo nero, bianco e rosso
- Ali gialle e nere
- Parti inferiori chiare con sfumature fulve
- Gregario
- Volo ondulato
- Frequenta zone suburbane e campagna alberata
- Sedentario, nidificante, migratore e svernante

Balestruccio

- Becco piccolo e nero
- Corpo nero superiormente con grande area bianca sul groppone
- Parti inferiori bianche
- Grande volatore costruisce nido con foro
- Frequenta zone urbane, suburbane e campagna
- Migratore, nidificante

Sparviere

- Becco adunco e nerastro
- Corpo e ali superiormente marrone scuro
- Parti inferiori chiare barrate di scuro (con arancio sfumato nel maschio)
- Ali arrotondate e larghe
- Volo diritto alternato tra battiti e planate
- Frequenta zone suburbane e campagna alberata
- Migratore, svernante, nidificante

♂

♀

Civetta

- Becco corto e adunco
- Colorazione superiore marrone con screziature chiare
- Inferiormente chiara con screziature marroni
- Volo ondulato
- Frequenta zone suburbane e campagna
- Sedentario, nidificante

Vista da dietro mostra dei «falsi occhi»

Beccamoschino

- Becco sottile
- Corpo e ali superiormente fulvi pesantemente striati di nero.
- Parti inferiori fulvi e gola biancastra
- Dimensioni molto piccole
- Volo canoro a «festoni»
- Facile sentire il canto tipico, più difficile vederlo
- Frequenta zone incolte, campagna e zone umide con aree incolte
- Sedentario, nidificante