

Corso di birdwatching

Uccelli di pianura (0-199 mslm)

Top 51-100

L'ordine delle schede segue la frequenza di osservazione delle specie:
dalle più comuni fino a quelle via via meno comuni

18/6/2025



*Testi, disegni e foto (se non diversamente
indicato) di
© Emanuele Stival*

Ibis sacro

- Becco lungo, nero e arcuato verso il basso
- Corpo bianco e nero (capo e collo neri)
- Zampe nere
- Volo non veloce e diritto
- Frequenta zone umide
- Miratore, svernante, nidificante (recente)



Taccola

- Becco nero e robusto
- Colorazione nera con nuca e collo posteriormente neri
- Occhio celeste
- Gregario
- Frequenta zone urbane e campagna
- Sedentario, nidificante



Volpoca

- Becco allargato, rosso con gobba sopra nel maschio
- Colorazione bianco, fulvo e nera
- Volo diritto e veloce
- Barra alare verde scuro poco visibile
- Frequenta zone umide
- Gregario
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

♂ a destra ♀ a sinistra



Pavoncella

- Becco medio e assotigliato
- Corpo e ali superiormente verde scuro con estremità alari nerastre
- Parti inferiori biancastre con arancio nel sottocoda e ali bianco / nere
- Petto nero e capo bianco e nero con ciuffo
- Coda bianca e nera con piccola area fulva, ali arrotondate
- Gregario
- Frequenta la campagna aperta e zone umide
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

♂



Codirosso spazzacamino

- Becco nero sottile
- Corpo prevalentemente grigio scuro anche petto, coda rosso mattone
- Molti maschi in primavera hanno pannello alare bianco e gola e muso neri
- Volo furtivo
- Frequenta zone montane con rocce e sassi e aree urbanizzate
- Migratore, nidificante, svernante

Probabile ♂ primavera



Tipo ♀ giovani e alcuni maschi



Migliarino di palude

- Becco tozzo e nero
- Maschio in abito nuziale con capo nero con bianco su collo posteriore con baffo fino al becco, gola nera
- Parti superiori marroni, coda nera con timoniere esterne bianche
- Femmina con capo marrone e striature biancastre
- Frequenta zone umide con vegetazione ripariale
- Migratore, svernante, nidificante raro



♂ abito nuziale



♀



Gabbiano corallino

- Becco rosso con piccola banda nera verso l'apice
- Corpo quasi completamente bianco e grigio chiaro sopra (adulti)
- Capo nero in abito nuziale, con anello bianco attorno all'occhio
- Frequenta lagune, valli da pesca e l'entroterra
- Gregario
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante



Immaturato

Abito nuziale



Abito invernale



Ballerina gialla

- Becco sottile allungato nerastro
- Schiena e capo prevalentemente grigi
- Coda molto lunga
- Giallo intenso nella zona anale e sul groppone
- Barre alari poco evidenti da posata
- Solitaria
- Volo ampiamente ondulato
- Frequenta torrenti, fiumi, fossati e canali
- Migratrice, nidificante, svernante



Cuculo

- Becco nero un po' arcuato
- Corpo superiormente e ali grigi (maschio), rossiccio con screziature nerastre (talune femmine)
- Anello perioculare e zampe gialle
- Coda con screziature e bordature bianche
- Volo diritto con battiti regolari
- Frequenta zone umide e campagna
- Migratore, nidificante



♀



giovane

♂



♀ rossiccia



Piro piro piccolo

- Becco discretamente lungo
- Corpo marrone con screziature fini e scure
- Sopracciglio abbastanza evidente
- Barra alare bianca e bordatura coda bianca
- Volo con battiti intervallati da brevi planate
- Frequenta zone umide anche con rive ripide e urbanizzate
- Migratore, svernante, nidificante



Passera mattugia

- Becco tozzo e robusto
- Vertice, collo e parte della schiena marroni
- Petto e gola neri – guance bianche
- Barra alare bianca
- Frequenta zone urbane e campagna
- Sedentario, nidificante



Rigogolo

- Becco rosso scuro e un po' appuntito
- Corpo e ali neri e giallo (intenso nel maschio)
- Canto caratteristico, più difficile vederlo, elusivo
- Volo abbastanza diritto
- Frequenta la campagna alberata vicino all'acqua
- Migratore, nidificante



♀



♂

♂



♀



Pigliamosche

- Becco piccolo e nerastro
- Corpo e ali superiormente marron con sottili screziature bianche sul capo
- Petto e gola bianco sporco striati sul petto di marrone
- Solitario
- Frequenta zone alberate con chiari
- Volo breve
- Migratore, nidificante



Beccaccia di mare

- Becco lungo, robusto e rosso arancio
- Corpo superiormente, collo e capo neri
- Ali nere con ampia barra bianca
- In abito invernale collare bianco sul collo
- Barra alare bianca
- Volo diritto abbastanza veloce
- Frequenta zone umide lagunari e litorali
- Migratore, nidificante, svernante raro



Abito invernale



Svasso piccolo

- Becco lungo e appuntito
- Corpo marrone rosato sopra e biancastro sotto
- Collo lungo bianco e nero dietro
- Ampia banda alare bianca
- Ciuffi auricolari rossicci sfumati al nero (solo abito nuziale)
- Volo diritto e veloce
- Si immerge per cibarsi
- Frequenta zone umide profonde e mare
- Migratore, svernante



Abito nuziale



Abito invernale



Passera scopaiola

- Becco piccolo
- Corpo e ali marrone screziato di scuro
- Capo marrone e grigio
- Piccola barra alare di macchiette bianche
- Volo furtivo
- Solitario
- Frequenta zone con arbusti e cespugli
- Migratore, nidificante, svernante



Pantana

- Becco discretamente lungo, robusto e lievemente curvato verso l'alto
- Corpo e ali superiormente marroni screziati di bianco
- Coda biancastra finemente barrata e groppone – dorso bianchi
- Zampe verde - giallo
- Volo veloce e diritto
- Discretamente gregario
- Frequenta zone umide
- Migratore, svernante



Gruccione

- Becco sottile lungo, un po' ricurvo e appuntito
- Corpo e ali molto colorati di giallo, rosso-marrone, arancio e nerastro
- Parti inferiori azzurrate e ali appuntite
- Nidifica in colonie con nidi in cavità sotterranee
- Volo diritto di spostamento e in caccia con molte variazioni di direzione
- Frequenta la campagna
- Migratore, nidificante



Sterna comune

- Becco affusolato rosso (in abito riproduttivo)
- Vertice nero (sfumato di bianco sulla fronte in abito invernale)
- Superiormente grigio chiaro, zampe rosse
- Volo un po' irregolare seguendo i battiti alari
- Gregario nidifica in colonie
- Frequenta zone umide soprattutto lagunari e vallive
- Migratore, nidificante



Abito invernale



Alzavola

- Becco nerastro appiattito
- Maschio con capo rosso mattone con grande stria verde scuro
- Maschio con corpo grigiastro finemente vermicolato di bianco
- Barra alare verde scuro bordata di bianco
- Fianco con stria bianca e sottocoda giallo
- Femmina prevalentemente marrone
- Volo diritto e veloce
- Si nutre in superficie
- Frequenta zone umide
- Migratore, svernante




♂

♂



♀



Rondine montana

- Becco corto e nero
- Corpo e ali marrone e molto più chiaro inferiormente
- Coda con macchiette bianche (visibili solo a coda aperta)
- Volo non veloce spesso sfruttando correnti dinamiche
- Frequenta zone rocciose o urbane
- Migratore, nidificante, svernante



Lucherino

- Becco appuntito e tozzo
- Corpo prevalentemente verde-giallo
- Nel maschio capo giallo con vertice e fronte neri
- Barra alare ampia e gialla
- Coda scura con lati gialli
- Gregario
- Frequenta zone arbustate con prati
- Migratore, nidificante, svernante



♂



♀



Saltimpalo

- Becco sottile nero
- Parti superiori marrone nerastre nel maschio con parti bianche su groppone e lati del collo
- Femmina prevalentemente marrone con sopracciglio appena visibile
- Barra alare bianca
- Sta spesso posato su posatoi sopraelevati
- Frequenta zone incolte
- Sedentario, nidificante

♂



♀



♂



Tortora selvatica

- Becco abbastanza esile e nerastro
- Corpo superiormente e parte centrale della ali fulvi macchiati di nerastro
- Capo, collo, petto e addome marrone chiaro rosati specie sul petto
- Lati del collo con macchia azzurrina striata di bianco e nero
- Zampe rosse e occhio cerchiato di rosso
- Coda nera con netto bordo bianco
- Volo diritto simile a quello dei limicoli
- Migratore, nidificante



Porciglione

- Becco arancio e nero abbastanza lungo e un po' arcuato verso il basso
- Superiormente marrone con screziature nerastre
- Guance e petto grigi, fianchi neri con barrature bianche
- Solitario
- Canto caratteristico (simile al verso del maiale)
- Frequenta zone umide
- Migratore, svernante, nidificante



Regolo

- Becco piccolo e nerastro
- Parti superiori verde-grigio
- Stria gialla bordata di nero sul vertice
- Barra alare bianca e macchia scura bordata di chiaro e bianco
- Solitario
- Volo furtivo
- Frequenta zone boscate e aree alberate soprattutto di conifere
- Migratore, nidificante, svernante



Moretta

- Becco azzurro con macchia nera all'apice
- Corpo nel maschio nero e bianco con ciuffo sul capo
- Femmina nera e marrone con
- Grande barra alare bianca
- Volo diritto e veloce con involo dopo rincorsa
- Gregario
- Frequenta zone umide
- Migratore, svernante



♀ a sinistra, ♂ a destra



Airone rosso

- Becco lungo ed appuntito
- Capo con egretta nera sulla nuca
- Corpo prevalentemente rossastro con sfumature grigie
- Colo tenuto a «S»
- Volo lento con battiti lenti
- Frequenta zone umide di vario tipo
- Migratore, nidificante



Fenicottero

- Becco rosa e nero (adulti) grosso con punta verso il basso
- Corpo e ali rosa, nero e rosso (adulti)
- Immaturi e giovani grigio rosato e nero
- Volo non veloce e lineare
- Gregario
- Frequenta zone umide soprattutto lagunari e vallive
- Migratore, svernante, estivante

Immaturi



Cavaliere d'Italia

- Becco nero lungo e sottile
- Parti superiori di corpo e ali neri; marrone il dorso della femmina
- Capo e collo spesso con spruzzature variabili nere
- Zampe molto lunghe rosso – rosa
- Volo diritto
- Frequenta zone umide
- Migratore, nidificante

♂ a sinistra, ♀ a destra




Moriglione

- Becco appiattino nerastro con banda azzurra
- Maschio con corpo e ali sopra grigi, petto nerastro e capo rosso mattone
- Femmina prevalentemente marrone con chiari / scuri
- Barra alare grigia (poco visibile)
- Volo diritto e veloce, gregario
- Si immerge per cibarsi ed esegue rincorsa per involarsi
- Frequenta zone umide con acqua profonda
- Svernante, migratore, sedentario nidificante



♂ a sinistra, ♀ a destra



Cannaiola comune

- Becco normale
- Corpo superiormente marrone
- Sopracciglio abbastanza evidente
- Volo furtivo
- Solitario
- Canto caratteristico e molto ripetitivo – FONDAMENTALE per il riconoscimento
- Frequenta zone umide ricche di canneti
- Migratore, nidificante



Codirosso

- Becco nero
- Maschio con schiena e nuca grigi che sfumano al bianco sulla fronte
- Maschio con guance e gola neri femmina con capo e gola marroni
- Entrambi i sessi con coda rosso mattone e petto arancio (più intenso nel maschio)
- Solitario
- Frequenta zone alberate con chiari
- Migratore, nidificante



♂



♀



Oca selvatica

- Becco robusto roseo
- Corpo grigio marrone
- Ali superiormente con molto grigio
- Zampe rosee
- Volo abbastanza veloce e diritto
- Gregario
- Frequenta zone umide
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante



Cutrettola

- Becco sottile e nero un po' allungato
- Parti superiori marrone verdastro più sul grigio nella femmina
- Capo con vari disegni nelle varie sottospecie e coda lunga
- Parti inferiori gialle nel maschio
- Gola bianca o gialla (dipende dalle sottospecie)
- Volo ondulato
- Frequenta la campagna
- Migratore, nidificante



♂

♀



Pispola

- Becco esile nero e giallo arancio
- Sopracciglio poco evidente
- Zampe giallo – rosato con unghia posteriore molto lunga
- Parti inferiori chiare molto striate
- Volo «incerto» o «intermittente»
- Frequenta la campagna aperta, prati anche umidi
- Migratore, svernante



Chiurlo maggiore

- Becco molto lungo e arcuato verso il basso (più lungo nelle femmine)
- Corpo e ali superiormente marroni screziati di bianco
- Coda biancastra finemente barrata marrone verso la terminazione
- Sopracciglio poco visibile
- Groppone – dorso bianchi
- Gregario
- Volo dritto
- Frequenta zone umide lagunari
- Migratore, svernante



Spioncello

- Becco sottile e nerastro
- Parti superiori marrone con striature poco intense
- In inverno petto striato di scuro (in estate rosato)
- Sopracciglio bianco evidente
- Zampe nerastre
- Sottile barra alare bianca
- Frequenta zone aperte e umide in inverno
- Migratore, nidificante, svernante



Lodolaio

- Becco adunco giallo e nero
- Corpo, ali e vertice superiormente marrone/grigio
- Parti inferiori di corpo e ali biancastri macchiati di nero
- Sottocoda rosso arancio e ali appuntite
- Capo con doppio mustacchio su guance e gola bianchi
- Volo veloce, agile e diritto
- Frequenta zone alberate con radure e campagna
- Migratore, nidificante



Nitticora

- Becco nero discretamente lungo e appuntito (adulti)
- Occhio rosso arancio grande
- Adulti in abito grigiastri con vertice e dorso neri
- Egrette sul capo chiare
- Volo non veloce e diritto con collo a «S»
- Gregario in nidificazione
- Frequenta zone umide
- Migratore, nidificante, svernante



Adulto

Adulto



Giovane

Avocetta

- Becco nero molto lungo con apice ricurvo verso l'alto
- Corpo e ali bianchi e neri
- Zampe lunghe grigio - azzurro
- Volo dritto
- Gregario
- Frequenta zone umide
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante



Giovane



Fiorrancino

- Becco piccolo e nero
- Parti superiore verde-giallo
- Vertice giallo-arancio bordato di nero
- Stria bianca sopra e sotto l'occhio (attraversato da stria nera)
- Barra alare bianca
- Solitario
- Volo breve e furtivo
- Frequenta zone urbane e campagna
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante



Fistione turco

- Becco appiattito rosso (maschio) e nero con punta rosa (femmina)
- Maschio con capo marrone-arancio, collo e parti inferiori neri, fianco bianco
- Femmina marrone con guance e buona parte del collo grigi
- Ampia banda alare bianca
- Volo diritto e abbastanza veloce
- Gregario
- Frequenta zone umide
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

♀ a sinistra, ♂ a destra



Upupa


- Becco lungo arcuato verso il basso
- Collo, petto schiena e capo color ocra-sabbia
- Cresta con macchie nere
- Ala nera con ampie fasce bianche
- Volo «dolce»
- Solitario
- Frequenta zone alberate con prato e campagna
- Migratore, nidificante



Falco pecchiaiolo

- Becco adunco
- Ali e corpo sopra marroni
- Parti inferiori biancastre con barrature (femmina più barrata)
- Macchie carpali scure e assenza di banda chiara su petto
- Barra alare bianca
- Piumaggio molto variabile; testa da «piccione»
- Solitario
- Frequenta zone alberate con radure
- Migratore, nidificante

Giovane



Beccaccino

- Becco molto lungo e sottile
- Corpo marrone con screziature scure
- Bordo bianco sottile sulle ali posteriormente
- Volo veloce con cambi repentini di direzione
- Poco gregario
- Frequenta zone umide
- Migratore, svernante



Mestolone

- Becco molto allargato «a mestolo» verso l'apice, nerastro nel maschio e arancione nella femmina
- Maschio con capo verde scuro
- Maschio con parti inferiori bianche e grande macchia fulva scura nel centro
- Barra alare bianca su ala parzialmente grigio azzurra
- Volo diritto e veloce
- Frequenta zone umide
- Migratore, svernante, nidificante raro

♂ a sinistra, ♀ a destra



Peppola

- Becco tozzo e robusto giallo
- Maschio in estate con capo nero (in inverno screziato di chiaro)
- Petto e gola arancio e fianchi chiari macchiati di scuro
- Barra alare bianca e groppone bianco
- Ali alla base anteriormente arancioni
- Gregario in inverno associato spesso a fringuello
- Frequenta zone urbane e campagna
- Sedentario, nidificante



♂ con fringuello (in basso)



Canapino comune

- Becco sottile arancio / marron
- Corpo inferiormente tutto giallo sporco
- Corta proiezione delle primarie
- Solitario
- Volo furtivo
- Frequenta zone umide e cespugliose
- Migratore, nidificante



Piovanello pancianera

- Becco lungo e un po' ricurvo verso il basso
- Parti superiori marrone rossiccio screziate in abito estivo
- Parti superiori grigie in abito nuziale
- Barra alare bianca
- Volo spesso di gruppo con cambiamenti di direzione
- Gregario
- Frequenta zone umide
- Migratore, svernante



Abito estivo



Abito invernale

