

*Partiamo alla  
ricerca degli uccelli!  
Mi hai già  
scoperto?*



# Gli uccelli attorno a casa mia

Emanuele Stival



# Lista delle specie osservate

Specie diffuse		Altre specie
<input type="checkbox"/> Germano reale	<input type="checkbox"/> Rondine	<input type="checkbox"/> Cuculo
<input type="checkbox"/> Rondone comune	<input type="checkbox"/> Balestruccio	<input type="checkbox"/> Gallinella d'acqua
<input type="checkbox"/> Piccione di città	<input type="checkbox"/> Codibugnolo	<input type="checkbox"/> Gru
<input type="checkbox"/> Colombaccio	<input type="checkbox"/> Luì piccolo	<input type="checkbox"/> Gabbiano corallino
<input type="checkbox"/> Tortora dal collare	<input type="checkbox"/> Capinera	<input type="checkbox"/> Marangone minore
<input type="checkbox"/> Gabbiano comune	<input type="checkbox"/> Fiorrancino	<input type="checkbox"/> Cormorano
<input type="checkbox"/> Gabbiano reale	<input type="checkbox"/> Regolo	<input type="checkbox"/> Airone cenerino
<input type="checkbox"/> Airone guardabuoi	<input type="checkbox"/> Scricciolo	<input type="checkbox"/> Falco di palude
<input type="checkbox"/> Garzetta	<input type="checkbox"/> Storno	<input type="checkbox"/> Assiolo
<input type="checkbox"/> Sparviere	<input type="checkbox"/> Merlo	<input type="checkbox"/> Allocco
<input type="checkbox"/> Poiana	<input type="checkbox"/> Pigliamosche	<input type="checkbox"/> Gruccione
<input type="checkbox"/> Civetta	<input type="checkbox"/> Pettiroso	<input type="checkbox"/> Falco pellegrino
<input type="checkbox"/> Picchio rosso maggiore	<input type="checkbox"/> Codiroso spazzacamino	<input type="checkbox"/> Taccola
<input type="checkbox"/> Picchio verde	<input type="checkbox"/> Codiroso comune	<input type="checkbox"/> Cincia mora
<input type="checkbox"/> Gheppio	<input type="checkbox"/> Passera d'Italia	<input type="checkbox"/> Rondine montana
<input type="checkbox"/> Ghiandaia	<input type="checkbox"/> Ballerina bianca	<input type="checkbox"/> Passera mattugia
<input type="checkbox"/> Gazza	<input type="checkbox"/> Fringuello	<input type="checkbox"/> Passera scopaiola
<input type="checkbox"/> Cornacchia grigia	<input type="checkbox"/> Verdone	<input type="checkbox"/> Peppola
<input type="checkbox"/> Cinciarella	<input type="checkbox"/> Cardellino	<input type="checkbox"/> Frosone
<input type="checkbox"/> Cinciallegra	<input type="checkbox"/> Verzellino	<input type="checkbox"/> Lucherino
		<input type="checkbox"/> Zigolo nero

# Alla ricerca degli uccelli

---

L'osservazione degli uccelli liberi e nella natura (birdwatching) spesso ci porta a viaggiare alla ricerca di nuove specie, ma non dimentichiamo che spesso gli uccelli vivono vicino a noi, alle nostre abitazioni, alle scuole, ai luoghi di lavoro. Perché non cominciare a osservarli e identificarli? Questa piccola guida ci aiuta a riconoscere 40 specie tra le più comuni che si possono osservare anche vicino alle abitazioni e altre infrastrutture civili.

## Identificare gli uccelli

Quando osserviamo un uccello in libertà siamo in grado di riconoscerlo? Per aiutarti ti suggeriamo di focalizzare questi aspetti:

- La forma del soggetto che stiamo osservando (allungato, compatto, proporzioni tra becco, zampe e corpo, lunghezza della coda, ecc.).
- I contrasti e la colorazione tra le varie parti del piumaggio e delle parti nude (becco, zampe in particolare).
- Il modo di muoversi, sia posato che in volo (cammina o saltella a terra? Si arrampica sul tronco degli alberi? il volo è dritto? Ecc.).
- Ambiente e contesto dell'osservazione (è posato sopra il tetto di un edificio o su un prato? È vicino ad un allevamento? Potrebbe essere di origine domestica? Ecc.).
- Comportamento e abitudini (sta mangiando? Pulendosi il piumaggio? Sta cacciando in volo o rincorre a terra qualche insetto? È confidente con l'uomo? È allarmato perché forse siamo vicini ai suoi piccoli che sono nel nido?).



Solo ora, dopo averlo osservato e studiato bene, prendi in mano la guida e cerca di identificarlo.



# Come usare l'opuscolo

## Dimensioni

Le dimensioni delle varie specie sono confrontate con alcune specie molto conosciute; passera d'Italia, merlo, piccione di città e cornacchia:




Esempio per il colombaccio (dimensioni intermedie tra piccione di città e cornacchia):




## Distribuzione e presenza

Come nell'esempio riportato del colombaccio per ogni specie è riportata la cartina di distribuzione nel Veneto colorata così:




e completata da una breve nota dal calendario (fenologia) annuale:



La cartina di distribuzione e la fenologia sono tratte e adattate da [https://www.birdingveneto.eu/atlasven2019/index\\_taxa.html](https://www.birdingveneto.eu/atlasven2019/index_taxa.html)

# Parti corporee degli uccelli

---



## Come aiutare gli uccelli

---

Gli uccelli hanno spesso il bisogno del nostro aiuto! Ma cosa possiamo fare? Ecco alcuni suggerimenti:

- installare cassette nido e mangiatoie in giardino
- fare in modo che il giardino sia a misura di uccello (con arbusti, cespugli, spazi verdi)
- installare un abbeveratoio o un piccolo stagnetto nel giardino.

Se incontri uccelli in difficoltà e per altri aiuti, sul sito della Stazione Ornitologica Svizzera troverai molti suggerimenti e idee utili!



<https://www.vogelwarte.ch/modx/it/uccelli/domande-e-informazioni/>



# Germano reale



Il germano reale è un'anatra molto diffusa e si può vedere in corsi d'acqua, fossati e stagni anche piccoli. Cerca il cibo filtrando l'acqua e il fango con il suo becco, ma pascola anche su campi dopo il raccolto. Emette dei versi tipici spesso anche in volo. Comune e diffusa.



Questa specie la puoi osservare in ogni stagione dell'anno. Frequenta zone umide e anche la campagna sempre però con presenza di fossati, canali o fiumi.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

# Rondone comune



I rondoni comuni si possono vedere quasi esclusivamente mentre volano nei nostri cieli; scendono al nido solo al momento della riproduzione. Dormono, cercano il cibo e si abbeverano sempre in volo, se cadono a terra non riescono più ad involarsi perché hanno ali rigide e zampe cortissime. Molto comune e diffuso.




Questa specie la puoi osservare soprattutto da aprile a luglio. Nidifica spesso in cavità di edifici e ricerca il cibo volando ovunque.



# Piccione di città



Il piccione di città è una specie strettamente dipendente dalle costruzioni (case e edifici vari) dove spesso nidifica. Si alimenta frequentemente in gruppi composti anche da centinaia di individui nei luoghi in cui trova il cibo: sui campi coltivati dopo il raccolto, nelle città, ecc. Ha colorazioni e piumaggi molto variabili, perlopiù a base di grigio. Si posa spesso sui fabbricati.



*colorazione di base grigia*

*forme compatte*

*si osserva spesso in gruppi e ha colorazioni molto varie*




Questa specie la puoi osservare in ogni stagione e in ogni mese dell'anno. Frequenta tanto la campagna aperta che la città.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

# Colombaccio



Il colombaccio è ormai diventato sempre più comune e diffuso e sempre più spesso nidifica in giardini, parchi e anche in città, purché ci sia qualche albero dove costruire il nido. Si alimenta sui prati e sui campi coltivati. La sua parata è particolare e consiste in un volo molto ondulato e curvato, talvolta eseguendo un “applauso” con le ali.




Questa specie la puoi osservare in ogni stagione e in ogni mese dell'anno. In inverno è gregaria e si può vedere in stormi numerosi; usa dormire in grossi gruppi in boschi isolati e poco disturbati.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

# Tortora dal collare



La tortora dal collare è molto diffusa e numerosa, soprattutto nei paesi e nelle piccole cittadine non molto urbanizzate. Durante la riproduzione esegue una parata che consiste in una salita ripida e poi una planata a semicerchio. Il suo canto è tipico e con tonalità basse e sembra dire un ripetuto “decaoctoo”.




Questa specie la puoi osservare in ogni stagione dell'anno soprattutto nei paesi e cittadine non molto urbanizzati o in case isolate nelle campagne. In inverno tende a costituire piccoli o medi gruppi soprattutto dove ricerca cibo in campagna.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

# Gabbiano comune



Il gabbiano comune mostra due piumaggi da adulto (nuziale e invernale) e un piumaggio giovanile che ha tonalità fulve e marroni. Per tutto l'anno è gregario e si osserva facilmente in gruppi anche di varie centinaia di individui. Nidifica in poche colonie sulle barene lagunari. Mangia molti alimenti e per questo si può dire onnivoro. Spesso si vede sui campi seguire i trattori per mangiare soprattutto invertebrati.




Il gabbiano comune è molto diffuso non solo sui litorali ma spesso anche nell'entroterra, anche sui campi arati. Si nutre anche nelle discariche. Si vede praticamente tutto l'anno ma più raramente da aprile a luglio.



# Gabbiano reale



Grande gabbiano che presenta vari piumaggi, dal giovane con molto marrone all'adulto (piumaggio che raggiunge gradatamente in 3-4 anni). Vola frequentemente spostandosi tra le zone di alimentazione e le aree di riposo percorrendo anche decine di km. Vola in ogni condizione di tempo anche sul mare. Si ciba anche di rifiuti ed è in sostanza onnivoro.



Il gabbiano reale si può osservare tutto l'anno. Diffuso soprattutto sulle coste, ma anche sui laghi e vicino ai corsi d'acqua. Spesso cerca il cibo sui campi arati specie al seguito dei trattori.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

# Airone guardabuoi



L'airone guardabuoi frequenta sia le zone umide che le aree aperte anche coltivate dove ricerca il cibo camminando e facendo movimenti caratteristici con il capo. Si nutre di invertebrati e altri piccoli animali. In inverno dorme in gruppo assieme ad altri aironi e cormorani. In primavera-estate nidifica in gruppi nelle "garzaie" (è gregario anche in inverno).




L'airone guardabuoi si può osservare tutto l'anno; evita le quote più alte. Soffre molto in inverno per il freddo intenso che rende difficoltoso il reperimento del cibo. Frequenta zone umide ma anche la campagna coltivata.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

# Garzetta



Airone discretamente grande dalle forme aggraziate e slanciate, e piumaggio candido. Si alimenta soprattutto di pesce e altri animali acquatici, ma non disdegna di cercare il cibo anche in incolti e campi, specialmente se con canaletti o semi allagati. Come molti altri aironi è gregario e nidifica in garzaie, mentre in inverno usa dormire in dormitori con i suoi consimili. In volo tiene il collo a "S".




La garzetta si può osservare durante tutto l'anno, specialmente vicino all'acqua: lagune, fiumi, canali, fossati e stagni. Evita le alte quote.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

# Sparviere



Rapace adatto a volare negli spazi ristretti, tra gli alberi, rami e arbusti, ma anche tra le siepi dei giardini e le case. Ha ali corte e larghe. Cattura altri uccelli in volo, anche di dimensioni sorprendenti per la sua taglia. Il suo volo di spostamento è diritto con tratti a volo battuto alternati a planate.




Lo sparviere si osserva durante tutto l'anno ma con maggiore difficoltà quando sta nidificando tra maggio e luglio. È diffuso ampiamente ma ha bisogno di piccoli boschi o grosse siepi per nidificare.



# Poiana



La poiana è un rapace molto comune e diffuso che si ciba soprattutto di roditori e in caso di penuria di cibo anche di animali morti. Generalmente solitaria, si osserva spesso in volo, anche durante le migrazioni, e quando è in caccia usa appostarsi su alberi o altri posatoi che le permettono di scrutare il terreno sottostante alla ricerca delle prede. Il suo richiamo usuale è un lungo fischio.




La poiana si osserva tutto l'anno, con più difficoltà durante il periodo riproduttivo. Frequenta le aree boscate e con siepi, e in inverno aree anche più aperte con scarse alberature.



# Civetta



Piccolo rapace notturno che si ciba soprattutto di piccoli roditori cercandoli sostando da un posatoio sopraelevato. Ha l'aspetto di un uccello "senza collo" e il capo sopra è appiattito. Ha ali corte e arrotondate. Spesso emette vari tipi di grida soprattutto nelle ore crepuscolari. Non di rado si vede anche di giorno.




La civetta si può osservare durante tutto l'anno, spesso vicino alle abitazioni più isolate e meno disturbate, soprattutto nelle aree meno densamente abitate.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

# Picchio rosso maggiore



Il picchio rosso maggiore vive prevalentemente sugli alberi di boschi e su siepi, dove cerca il cibo che è costituito da insetti o larve che si cibano di legno. Usa la coda come “terzo” piede per arrampicarsi lungo i tronchi e i rami. Nidifica in cavità scavate sul tronco degli alberi. Soprattutto in primavera si sente il suo tambureggiare e il suo richiamo che somiglia ad un forte “keek”. Il suo volo è fortemente ondulato.




Il picchio rosso maggiore è diffuso in tutto il Veneto e frequenta boschi di conifere e caducifoglie e campagne, parchi, ecc. con grandi siepi o alberi. Si osserva durante tutto l'anno.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

# Picchio verde



Questo picchio si nutre prevalentemente di formiche e trascorre molto tempo a terra. Emette frequentemente in ogni stagione il suo tipico canto che somiglia ad una forte risata. Come gli altri picchi costruisce il nido in una cavità sugli alberi e ha un volo ondulato.




Il picchio verde si può osservare durante tutto l’anno in quasi tutto il Veneto; frequenta boschi, siepi e anche giardini e parchi alberati.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

# Gheppio



Piccolo rapace diurno con ali appuntite e colore fulvo superiormente con coda grigia e banda nera. Spesso caccia da posato su una postazione sopraelevata oppure eseguendo lo “spirito santo” (rimane fermo in volo). Si alimenta di piccoli animali che si procura catturandoli al suolo. Ha un volo lineare e non molto veloce e non è molto vocifero.




Il gheppio è presente in quasi tutto il Veneto e osservabile in tutti i periodi dell'anno. Frequenta aree aperte nelle campagne con alberi o altri posatoi e non disdegna anche paesi e città dove usa posarsi sugli edifici più alti.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

# Ghiandaia



Corvide molto eclettico. Ha una alimentazione onnivora, cibandosi sia di vegetali che di piccoli animali. La sua voce è sgraziata e stridula, ma imita anche altri uccelli come ad esempio la poiana. Ha un volo lento e lineare. In autunno si alimenta spesso di ghiande, che ha l'abitudine di nascondere, per usarle poi in periodi di scarsità di cibo.



*piumaggio in buona parte grigio-marrone rosato con ali e coda nere e bianche*

*mustacchio nero dal becco alla guancia*

*tipica chiazza azzurra striata di nero sull'ala*

*groppone bianco molto evidente in volo*




La ghiandaia si osserva tutto l'anno in quasi tutto il Veneto; frequenta ambienti boscati, oppure con siepi e alberature, ma anche giardini di abitazioni in piccoli centri urbani.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

# Gazza



Corvide molto opportunista e intelligente, si alimenta di vari cibi, anche piccoli animali. Costruisce nidi voluminosi su alberi e tralicci. A terra cammina lentamente e circospetta, è abbastanza gregaria e si vedono spesso gruppi anche di oltre 10 soggetti assieme. Il volo è diritto e lento e il richiamo somiglia a un “che” ripetuto rapidamente.



La gazza si può osservare durante tutto l'anno con solo una flessione a luglio quando è meno facilmente osservabile. Frequenta la campagna aperta coltivata con alberi sparsi e vive anche vicino alle abitazioni in ambito rurale.



# Cornacchia grigia



Grosso corvide dal becco robusto e alimentazione onnivora; mangia anche animali morti. Spesso si vede anche in gruppi piuttosto numerosi, specie al tramonto quando in inverno va a dormire su aree alberate e sicure. Ha un volo diritto e non veloce. Il suo verso è simile ad un forte “cra” ripetuto.



← *vertice piuttosto piatto e becco robusto e incurvato sopra*

*piumaggio nero e grigio*




La cornacchia grigia si può osservare tutto l'anno in svariati ambienti, anche nei piccoli centri urbani e nelle zone industriali ed è distribuita praticamente in tutto il Veneto, anche a discrete quote.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

# Cinciarella



Piccolo passeriforme molto attivo e vivace. Si nutre di insetti e semi e spesso compie acrobazie per arrampicarsi sui rami e anche sulle canne di palude. Nidifica in cavità delle più disparate, spesso artificiali e in cassette nido. Ha un volo “sfarfallante” e irregolare, quasi furtivo. Il suo canto è abbastanza caratteristico e anche i richiami spesso attirano la nostra attenzione.



La cinciarella si osserva durante tutto l'anno in buona parte del Veneto, ma diventa più elusiva in periodo di nidificazione (maggio-luglio). Frequenta svariati habitat purché alberati, anche in città e giardini.




# Cinciallegra



La cinciallegra è un piccolo passeriforme sempre molto attivo e vivace. Si ciba di insetti e altri invertebrati e, soprattutto in inverno, di semi di vario tipo, prediligendo i semi di girasole. Si muove agilmente alla ricerca del cibo sugli alberi. Il suo canto caratteristico è un ripetitivo “ti-te ti-te...” oppure “ti-ti-te ti-ti-te...”. Nidifica in piccole cavità di vario tipo, spesso in cassette nido.

**Maschio**



*nel maschio la  
striscia nera arriva  
fino al ventre*

*capo bianco e  
nero*

*petto giallo con  
striscia nera*



**Femmina**



La cinciallegra è presente tutto l'anno in Veneto e frequenta svariati ambienti purché alberati, anche in città e villaggi purché con alberi e giardini.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

# Rondine




La rondine è una ottima volatrice e per procurarsi il cibo cattura gli insetti in volo eseguendo repentini cambi di direzione e volando talvolta a bassissima quota. Costruisce un nido a coppa soprattutto nelle stalle ma anche sotto i ponti. Da posata e in volo emette un canto molto melodioso e ricco di note variate.



*coda con macchiette  
bianche e groppone  
scuro*

*piumaggio sopra blu  
nerastro e sotto  
bianco e nerastro*



*gola rossiccio  
scuro, quasi  
nerastra*


*coda molto  
forcuta*



*nido a forma di  
coppa aperto sopra*




La rondine si osserva in tutto il Veneto da marzo a settembre con qualche individuo presente anche in ottobre. Frequenta tipicamente la campagna, preferibilmente dove ci sono stalle.




# Balestruccio



Il balestruccio, come la rondine è un perfetto volatore e si procura il cibo catturando gli insetti in volo con agili acrobazie a quote medie (difficile che voli basso). Costruisce il nido sotto i cornicioni di case e palazzine, anche in città. Non emette un canto vero e proprio di norma ma frequenti sono i richiami simili a gorgheggi.



Il balestruccio si osserva in tutto il Veneto da marzo a settembre con qualche individuo presente anche in ottobre. Frequenta i paesi e talvolta anche le città.



# Codibugnolo



Piccolo passeriforme dalla coda molto lunga. Costruisce un nido globulare alle biforcazioni dei rami sugli alberi. Sempre molto attivo, in inverno si vede soprattutto in gruppi famigliari di 8-10 individui cercare il cibo sugli alberi spesso appendendosi in varie posizioni. Si sente frequentemente richiamare con sottili vocalizzi ripetuti. Volo ondeggiante.




Il codibugnolo è osservabile in tutto l'anno con una flessione attorno a luglio quando diventa meno rilevabile. Frequenta vari ambienti alberati, soprattutto con caducifoglie, e anche parchi e giardini.



# Luì piccolo



Piccolo uccello sempre vivace che si alimenta di insetti. Si muove spesso fra i rami degli alberi, arbusti e cespugli; anche su canneto alla ricerca del cibo. Esegue spesso piccoli voli per catturare insetti in volo. Il suo canto assomiglia ad un ripetuto “cif cial” e il richiamo è un “luì” ripetuto (da cui il nome italiano). Il volo è abbastanza furtivo e sempre non lontano da terra, sostando spesso su alberi o o altre piante.



*colorazione verde-  
marrone  
superiormente e  
molto più chiara  
inferiormente*




Presente in Veneto durante tutto l'anno con flessioni in periodo riproduttivo; in pianura è perlopiù svernante e migratore (nidifica preferibilmente in collina-montagna).



# Capinera



Piccolo passeriforme dal comportamento elusivo, difficile individuarlo in inverno quando non canta. Sta sempre nel folto degli arbusti e cespugli dove anche nidifica. Esegue brevi voli "furtivi" di spostamento dai vari posatoi. In inverno si ciba anche di bacche, mentre in estate è tipicamente insettivoro. Il suo canto è melodioso.




Questa specie si osserva ovunque in Veneto e durante tutto l'anno ma con più difficoltà in autunno-inverno. Frequenta aree con caducifoglie, arbusti e cespugli anche in parchi e giardini.



# Fiorrancino



Piccolo passeriforme molto attivo e sempre in movimento spesso alla ricerca del cibo (piccoli insetti e invertebrati). Ha un richiamo molto sottile così come il canto. Il volo è furtivo e breve spesso tra vari cespugli, arbusti e alberi. Preferisce frequentare alberi e arbusti decidui.




Il fiorrancino è presente durante tutto l'anno con lieve flessione nei mesi estivi. Distribuito in buona parte del Veneto e nidifica in habitat forestali dalla alta pianura alla montagna. Svernante in pianura centro orientale.



# Regolo



Piccolo passeriforme molto somigliante al fiorrancino anche nel comportamento, sempre attivo e vivace nelle attività di ricerca del cibo. Ha un richiamo molto sottile così pure il canto. Si sposta velocemente e in volo basso tra vari cespugli, arbusti e alberi che frequenta. Preferisce le conifere, al cui tronco spesso si aggrappa.




Il regolo si osserva in Veneto tutto l'anno con una flessione tra aprile-maggio e settembre. Frequenta boschi di conifere, parchi e giardini preferibilmente con sempreverdi.



# Scricciolo



Piccolissimo passeriforme marrone che tiene spesso la coda piegata all'insù muovendola anche a scatti. Cerca il cibo nell'intrico della vegetazione, anche a terra tra le foglie. Assume comportamento elusivo tranne quando canta e si mette in vista eseguendo delle caratteristiche e ripetute note.



*coda tenuta spesso all'insù*

*becco piuttosto appuntito*

*colorazione generalmente marrone screziata di scuro*

*si muove alla ricerca del cibo, spesso a terra tra lo "sporco"*




Presente in tutto il Veneto dalle medie quote in su come nidificante e quasi ovunque come svernante alle quote più basse. Frequenta zone con cespugli e siepi anche in ambito suburbano e urbano.



# Storno



Specie gregaria (sta in gruppo con molti suoi consimili), molto diffusa e frequente soprattutto nelle città e nei paesi. Cerca il cibo prevalentemente a terra camminando oppure su alberi e arbusti alimentandosi di bacche. Ha un volo non veloce e rettilineo e non è raro vederlo in volo in gruppi numerosi specialmente in autunno/inverno quando si raggruppa per andare ai dormitori.




Distribuito in quasi tutto il Veneto (evita le alte quote) durante tutto l'anno. Frequenta aree urbane, suburbane e le campagne, prati e svariati ambienti alla ricerca del cibo.

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

# Merlo



I merli si possono vedere in giardini e aree dove siano presenti almeno degli alberi e cespugli. Raccolgono il cibo a terra, spesso invertebrati, e nella stagione fredda anche su alberi e arbusti cibandosi di bacche. Nella stagione riproduttiva canta soprattutto all'alba e al tramonto con una dolce melodia e toni flautati. Molto comune e diffuso.




Questa specie la puoi osservare in Veneto in ogni stagione dell'anno (in poche aree non è presente in inverno). Frequenta boschi, siepi e giardini urbani e suburbani.

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


# Pigliamosche



Passeriforme che si alimenta partendo da un posatoio e compiendo brevi voletti per catturare insetti in volo. Di solito se ne sta posato in vista ed è discretamente confidente. Nidifica in nidi posti su varie nicchie spesso su abitazioni o costruzioni ed edifici vari.




Il pigliamosche è presente pressoché in tutto il Veneto in primavera-estate. Frequenta zone aperte con alberi e cespugli sparsi e anche parchi e giardini suburbani.



# Pettirosso



Piccolo passeriforme dal comportamento territoriale per tutto l'anno; non ama stare vicino ai suoi consimili. Cerca il cibo soprattutto a terra, saltellando, e ama in inverno frequentare anche le mangiatoie. Facile da rilevare in inverno, quando si mette spesso in vista, in periodo riproduttivo diventa più elusivo.




Diffuso in tutto il Veneto. Nidifica soprattutto nelle zone collinari e montane, sverna abbassandosi di quota. Frequenta aree boscate e anche giardini e parchi urbani e suburbani.



# Codirosso spazzacamino



Il codirosso spazzacamino è una specie che si può vedere facilmente perché si posa spesso in vista, su posatoi elevati, rocce e tetti di abitazioni. Vola di solito vicino al suolo per brevi spostamenti. Cattura insetti preferibilmente sul terreno o altre aree con scarsa copertura arborea.



**Maschio**

macchia  
bianca

gola e faccia  
neri

*piumaggio  
prevalentemente  
grigio e nero con  
area caudale  
arancione  
intenso*

*piumaggio tipico  
di femmine e  
giovani ma  
anche di alcuni  
maschi adulti*




Presente in tutto il Veneto durante tutto l'anno, nidifica soprattutto a quote elevate e scende in pianura per svernare. Frequenta aree aperte tipicamente aride talvolta con alberi sparsi; in pianura si osserva in paesi e città spesso sugli edifici.



# Codirosso comune



Il codirosso comune è una specie piuttosto confidente nei confronti dell'uomo, arrivando a nidificare spesso anche in cassette nido artificiali. Usa fermarsi su posatoi in vista da dove spicca brevi voletti per catturare piccole prede. Muove spesso su e giù la coda.




Specie distribuita in buona parte del Veneto con maggiori densità a quote medio – basse. Frequenta zone alberate con radure e parchi e giardini.



# Passera d'Italia



Specie molto legata all'uomo soprattutto per la nidificazione che avviene in genere sui tetti e altre cavità delle case. Molto gregaria, in particolare durante l'inverno, quando forma gruppi di varie dimensioni e cerca il cibo sui campi. Per sopravvivere ha bisogno di rifugi in tutte le stagioni, come sempreverdi o rovi.




Presente durante tutto l'anno praticamente in tutto il Veneto. Frequenta tipicamente la campagna con abitazioni, dove nidifica evitando le aree più urbanizzate. Preferisce le aree nei pressi di allevamenti di animali.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

# Ballerina bianca



Specie camminatrice soprattutto nella ricerca del cibo che si svolge per lo più a terra. Quando è posata e cammina spesso oscilla su e giù la coda. Durante il volo compie ampie ondulazioni caratteristiche come il suo richiamo. In ambiti urbani e suburbani è una specie molto confidente. Maschi e femmine sono uguali.



La ballerina bianca si incontra in svariati habitat aperti, anche urbani e suburbani. Spesso nidifica su edifici. Gradisce la presenza dell'acqua nelle vicinanze. Si osserva durante tutto l'anno in tutto il Veneto.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

# Fringuello



Il fringuello è una specie prevalentemente granivora e per cibarsi cerca il cibo a terra, soprattutto in inverno quando frequenta anche mangiatoie in parchi e giardini. Quando cerca il cibo cammina e mentre vola esegue ondulazioni tipiche dei fringillidi. D'estate nidifica in territori che delimita con il tipico canto molto ripetitivo, mentre in inverno diventa fortemente gregario.

**Maschio**



vertice, nuca e lati del collo grigio-azzurri; guance, petto e addome rosso mattone



*maschi e femmine hanno sempre delle barre alari bianche ben evidenti (su sfondo nerastro), in volo e posati*


**Femmina**



*femmina perlopiù marrone e nerastra con un po' di grigio ai lati del collo*




Il fringuello è diffuso praticamente in tutto il Veneto e durante tutto l'anno. Per nidificare ha bisogno di alti alberi e in particolare conifere. In inverno frequenta aree aperte con alberature e giardini e parchi urbani.




# Verdone



Specie granivora che frequenta regolarmente in inverno le mangiatoie dove predilige i semi di girasole. Quando il maschio corteggia la femmina si mette in posa evidenziando le parti gialle del piumaggio. Canta ripetendo un verso particolare e facilmente riconoscibile. Si nutre al suolo e in volo compie evidenti ondulazioni tipiche dei fringillidi.




Il verdone è distribuito praticamente in tutto il Veneto dove si può osservare praticamente tutto l'anno. Frequenta i margini dei boschi ma anche aree urbane e suburbane con parchi e giardini.



# Cardellino



Il cardellino è molto colorato con colori brillanti e vivaci. Ha un becco appuntito e conico e condivide con gli altri fringillidi un volo molto ondulato. Ha un canto piuttosto variegato con trilli rapidi che emette in periodo riproduttivo. È gregario d'inverno e usa alimentarsi sia a terra che su alte piante erbacee e non di rado sui cardi (da qui il nome cardellino).



Il cardellino è distribuito in tutto (o quasi) il Veneto e in tutte le stagioni dell'anno. Frequenta aree alberate con radure e zone suburbane. D'inverno frequenta spesso incolti e aree aperte.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

# Verzellino



Il verzellino è un piccolo uccello il cui maschio in estate usa cantare da un posatoio in vista, spesso antenne o cime degli alberi, con un vocalizzo simile ad uno stridio continuo. Si alimenta a terra e ha un volo ondulato, mentre quando canta e fa la “parata” ha un volo particolare con le ali che sembrano battere lentamente. In inverno è abbastanza gregario.



Il verzellino si osserva prevalentemente nei pressi delle abitazioni di campagna o delle periferie urbane; abita quasi tutto il Veneto, ma d’inverno diventa di difficile osservazione.



# Altri uccelli osservabili vicino a casa

---

A seconda di dove abiti e anche di dove vai a scuola potresti incontrare altre specie di uccelli. Alcune specie poi si vedono durante le migrazioni mentre passano alte nel cielo. Per una completa identificazione puoi consultare una guida o su:

<https://www.birdingveneto.eu/atlasven2019/index.html>



**Cuculo**



**Gallinella d'acqua**



**Gru**



**Gabbiano corallino**



**Marangone minore**



**Cormorano**



**Airone cenerino**




**Falco di palude**



**Assiolo**



**Allocco**



**Gruccione**



**Falco pellegrino**



**Taccola**



**Cincia mora**



**Rondine montana**



**Passera mattugia**



**Passera scopaiola**



**Peppola**



**Frosone**



**Lucherino**



**Zigolo nero**



*Sul nostro sito web  
[www.veneziabirdwatching.eu](http://www.veneziabirdwatching.eu)  
trovi guide, pubblicazioni e  
tanto altro per conoscere e  
osservare gli uccelli*

Se hai fatto osservazioni interessanti, hai bisogno di chiarimenti, aiuto nell'identificazione o curiosità in ambito ornitologico, puoi scrivere a: [info@veneziabirdwatching.eu](mailto:info@veneziabirdwatching.eu) e faremo il possibile per aiutarti.

**Foto e testi** di Emanuele Stival

© 2024, Associazione Venezia Birdwatching

Un ringraziamento particolare va alla stazione ornitologica svizzera (Vogelwarte.ch) che ha consentito l'utilizzo come link della sua pagina web dedicata alle informazioni sugli uccelli, e a Francesca Stival e Tomaso Bisol per il lavoro di revisione e correzione dei testi.



[www.veneziabirdwatching.eu](http://www.veneziabirdwatching.eu)