

CODICI ATLANTI IN ORNITHO / NATURALIST

Una nota particolare va fatta per le specie coloniali come cormorani, aironi, laridi: per tutte queste specie si utilizzano solo i codici dal 10 in su (costruzione nido). Spesso infatti vari indizi che potrebbero essere di nidificazione (corteggiamento, ecc.) si svolgono anche molto lontano dal sito di nidificazione.

Fare attenzione, specialmente per le specie meno comuni, che il trasporto imbeccata venga effettivamente recapitato ad un pullo non volante; varie specie usano offrire il cibo al partner o ai giovani che sono in grado già di volare su buone distanze e quindi non sono indice di nidificazione in loco.

In genere il codice atlante va inserito quando viene proposto dall'applicazione facendo però attenzione a specie come il falco cuculo che talvolta si fa vedere con individui in ritardo nelle migrazioni. Fare attenzione anche ad altre specie che cantano al di fuori del periodo della riproduzione in luoghi dove normalmente non nidificano o sono rarissimi come nidificanti (vedi pettirosso, lui piccolo, scricciolo, ecc.). In questi casi meglio verificare più avanti la presenza della specie. Di norma il periodo in cui una specie è quasi sicuramente nidificante (se presente) è il mese di giugno.

Se si rilevano elementi fortemente probanti di nidificazione come ad esempio la costruzione del nido, inserire il codice anche se non viene proposto.

Per specie rare o poco comuni come nidificanti se possibile raccogliere documentazione fotografica

Per l'utilizzo dell'app Naturalist di BioloVision verificare su "Preferenze" e poi "Elenco dei codici atlante" e quindi assicurarsi che sia selezionata la voce "19 codici (CH,IT)" (*)

IN TUTTI I CASI CERCARE DI NON ARRECARRE DISTURBO ALLA NIDIFICAZIONE DI QUALSIASI SPECIE

Codice atlante	Numero codice Ornitho e Naturalist (*)	Note di utilizzo e applicazione
NIDIFICAZIONE POSSIBILE		
Osservazione della specie nel suo periodo di nidificazione	1	Non utilizzare mai
Presenza nel suo habitat durante il suo periodo di nidificazione	2	Si utilizza quando non si hanno particolari indizi di nidificazione, con la sola presenza di un soggetto posato o in attività trofica. Evitare di inserirlo per individui osservati in solo volo alto e direzionale.
Maschio in canto presente in periodo di nidificazione, udito richiami nuziali o tambureggiamento, visto maschio in parata	3	Utilizzare con maschio in canto (anche solo sentito e non visto). In caso di picchi anche in caso di tambureggiamento. Per varie specie (colombaccio, pavoncella, ecc.) anche se si osserva la parata senza canto.
NIDIFICAZIONE PROBABILE		
Coppia presente nel suo habitat nel suo periodo di nidificazione	4	Utilizzarlo in caso di coppia. Il problema è capire che si tratta di una coppia; facile usarlo per maschio e femmina di anatidi vicini tra di loro, oppure 2 taccole posate vicine tra di loro, ecc. Usare cautela per gli anatidi che possono essere in migrazione tardiva
Comportamento territoriale (canto, comportamento aggressivo con vicini, ecc.) osservato in uno stesso territorio in due giorni diversi a 7 o più giorni di distanza	5	Si usa quando, ripassando per lo stesso luogo a distanza di almeno 7 giorni, si rileva la continuativa presenza (canto, comportamento aggressivo, ecc.) per la stessa specie.
Comportamento nuziale: parata, accoppiamento o scambio di nutrimento tra adulti	6	Utilizzare quando si osserva l'accoppiamento o il tentativo dello stesso, o lo scambio di nutrimento tra adulti. Anche in caso di parata di corteggiamento con maschio e femmina presenti.
Visita di un probabile sito di nidificazione. Diverso da un sito di riposo	7	Simile al codice 14 (13) ma con maggiore incertezza. Utilizzare ad esempio in periodo adatto quando i rondoni comuni / pallidi sfrecciano con grida vicinissimi ai nidi, oppure quando si osserva un gruppetto di passerì sul tetto di una casa dove probabilmente nidificano. Usarlo normalmente per specie comuni come nidificanti. Usare moltissima cautela per le specie più rare. Attenzione a non usarlo ad esempio per picchi che entrano in un nido sul finire dell'inverno perché è un sito di riposo che può non essere usato per la nidificazione.
Gridi d'allarme o altri comportamenti che indicano la presenza di un nido o di giovani nelle vicinanze	8	Si usa tipicamente quando osservate un adulto che allarma su un predatore (ad esempio un merlo che allarma su un gatto). Usare ad esempio anche quando certe specie picchiano in volo minacciosamente anche nei nostri confronti perché siamo vicini ad un loro nido con piccoli o ai piccoli nidifughi (esempio gabbiano reale, pavoncella, ecc.)
Prova fisiologica: placca d'incubazione molto vascolarizzata o uovo presente nell'ovidotto. Osservazione su un uccello in mano	9	Utilizzabile solo da inanellatori
Trasporto di materiale o costruzione di un nido; scavo di una cavità da parte di picchi	10	Si riporta quando si osserva la costruzione di un nido; ad esempio quando un gruccione scava nella terra di un argine fluviale oppure quando si osserva un merlo che trasporta un ciuffo d'erba; oppure ancora un colombaccio con un ramoscello che si infila su un'albero.
NIDIFICAZIONE CERTA		
Individuo che simula una ferita o che distoglie l'attenzione come anatre, galliformi, limicoli,...	11	Da utilizzare in caso di parata di distrazione usata soprattutto da femmine di anatre (frequente nel germano reale) o altre specie. Osservando l'individuo che si comporta così sembra incerto se restare o scappare e può apparire ferito o con u'ala in posizione innaturale
Nido vuoto utilizzato di recente o gusci d'uovo della stagione in corso	12	Di difficile utilizzo perché bisogna escludere che il nido non risalga all'anno precedente. Usare con molta cautela
Giovani in piumino o che hanno appena lasciato il nido e incapaci di volare su lunghe distanze	13	Utilizzare quando si osservano giovani appena usciti dal nido e con volo incerto. Di solito questi giovani appaiono impacciati e che necessitano di aiuto dai genitori. Di solito hanno dimensioni lievemente o molto più piccoli dei genitori. Non usarlo per giovani che volano bene
Adulto che arriva a un nido, lo occupa o lo lascia; comportamento che rivela un nido occupato il cui contenuto non può essere verificato (troppo alto o in una cavità)	14	Da usare tipicamente ad esempio quando si vede una capinera che si infila in un cespuglio per almeno 2-3 volte consecutivamente senza incertezze; segno che li ha il nido e che non è una semplice area di ricerca del cibo
Adulto che trasporta un sacco fecale	15	Adulto che trasporta fuori dal nido un sacco fecale (le deiezioni dei pulli nidicoli racchiuse in un sacco). In naturalist si può usare il codice seguente (14)

Codice atlante	Numero codice Ornitho e Naturalist (*)	Note di utilizzo e applicazione
Adulto che trasporta cibo per i piccoli durante il suo periodo di nidificazione	16	Tipica l'osservazione di un merlo con dei vermetti nel becco, oppure una taccola con il cibo nel gozzo che si infila nella cavità dove con tutta probabilità nidifica. Fare attenzione alle specie coloniali o altre come rapaci che possono portare il cibo a notevole distanza; in questo caso cercare di capire dove si trova il punto dove il cibo viene portata. Varie specie trasportano il cibo lontano solo per mangiarlo e non per nutrire i piccoli, come ad esempio il falco pescatore.
Gusci d'uovo schiuso (o predato recentemente)	17	Usare quando si riesce a capire con certezza a che specie appartengono i gusci (o le uova) rinvenute
Nido visto con un adulto in cova	18	Da usare ad esempio quando si osserva un merlo in cova sul nido (ad esempio durante lavori di potatura può succedere) oppure un colombaccio acquattato sul suo nido. Usare anche ad esempio con un laride in cova, però fare attenzione che sia su un nido e non semplicemente in riposo a terra.
Nido contenente uova o piccoli (visti o sentiti)	19	Da usare quando si sentono i versi dei piccoli nel nido. Naturalmente bisogna capire di quale specie si tratta. Ad esempio se notate una cinciallegra che vi guarda circospetta e nel contempo (o poco prima) sentite i richiami dei piccoli provenire da una cavità. Oppure ancora in caso di piccoli di aironi in una garzaia o all'ispezione di una cassetta nido contenente i pulli.
Specie non rilevata nonostante le ricerche. Assenza accertata nel corso di rilevamenti mirati, svolti con tecniche appropriate e specifiche per una determinata specie oppure eseguiti in località in cui era nota in passato la presenza della specie.	99	Solo per rilevatori esperti
CODICI GENERICI		
Nidificazione possibile	30	Non utilizzare mai
Nidificazione probabile	40	Non utilizzare mai
Nidificazione certa	50	Non utilizzare mai

(*) Su Naturalist utilizzare la selezione con 19 codici (CH, IT)

Elenco dei codici atlante

- 16 codici (EBCC, FR)
- 20 codici (DE,LUX,CAT)
- 19 codici (CH,IT)
- 16 codici (AT)
- 17 codici (PL)