

Guida all'identificazione dei  
**limicoli**  
dai burinidi ai glareolidi



Emanuele Stival



## **Introduzione**

Questa pubblicazione tratta delle specie presenti in Italia; (ne sono state tralasciate solo alcune di accidentali). Le schede non sono esaustive, ma riportano le foto e le peculiarità maggiormente utili al riconoscimento. Le dimensioni delle varie specie sono tratte da Svensson L., Grant P.J., Mullarney K. & Zetterstrom D. - Guida degli Uccelli d'Europa, Nord Africa e Vicino Oriente Terza edizione. - Ricca editore. La sequenza e la tassonomia seguono la Lista CISO-COI 2020 degli uccelli italiani (Nicola Baccetti, Giancarlo Fracasso & Commissione Ornitologica Italiana (COI)). E' riportata in ogni scheda una categoria di frequenza analoga a quelle adottate in *www.ornitho.it*

Abbreviazioni usate:

♂                    maschio adulto  
♀                    femmina adulta

Tutti i diritti riservati. E' vietata la copia, la riproduzione anche parziale, la stampa del presente lavoro senza il consenso dell'autore. E' permesso l'uso personale o scolastico senza fini di lucro.

Se non diversamente indicato, le foto sono di Emanuele Stival.

## **Ringraziamenti**

Un particolare grazie va ad Alessandro Paiusco e Tomaso Bisol per la revisione del lavoro. Per aver reso disponibili le loro foto: Matteo Cargasacchi, Fabrizio Cimino, Steven Hueting, Lior Kislev, Fabio Piccolo, Luca Sattin, Giacomo Sighele, Maurizio Sighele.

Foto di copertina: combattente

Foto in retro copertina: pantana

Venezia - settembre 2023

## Occhione - Stone-curlew (*Burhinus oedicnemus*)

poco frequente

Lunghezza: 40-44 cm, apertura alare: 77-85 cm

colorazione mimetica con  
stria chiara con bordi  
scuri sull'ala visibile  
anche da posato

occhio  
grande  
giallo



zampe gialle

becco corto  
giallo con  
apice nero

cammina veloce



ali con macchie  
bianche su sfondo  
scuro alle estremità  
alari

di abitudine terricole,  
spesso si allontana  
camminando o  
correndo

## Beccaccia di mare - Oystercatcher (*Haematopus ostralegus*)

poco frequente

Lunghezza: 40-45 cm, apertura alare: 80-86 cm

adulti in abito estivo con  
corpo e collo neri e bianco  
inferiormente - in abito  
invernale compare una  
barra bianca sulla gola

occhi rossi

becco lungo  
rosso - arancione



zampe rosate

immaturo in  
inverno



coda con banda  
terminale nera e  
groppone bianco



adulto in volo  
mostra evidente  
barra alare bianca

giovane




## Avocetta - Pied Avocet (*Recurvirostra avosetta*)

poco frequente

Lunghezza: 42-46 cm, apertura alare: 66-77 cm

adulti con corpo e ali  
bianchi e neri



becco lungo,  
sottile, nero e  
curvo all'insù

zampe  
lunghe  
azzurre

caratteristico disegno  
con alternanze bianche  
e nere su ali e spalle



gregaria soprattutto  
in inverno



si alimenta con  
movimenti laterali  
del becco, anche  
nuotando



giovane con parti scure  
sfumate di marrone


**Cavaliere d'Italia - Black-winged Stilt (*Himantopus himantopus*)**

diffuso

Lunghezza: 35-40 cm, apertura alare: 67-83 cm

♂ adulto con parti superiori nere e spesso sono neri anche il capo e parte della parte posteriore del collo; parti inferiori biancastre talvolta rosate

occhi rossi, becco nero esile, dritto e molto lungo




zampe molto lunghe rosso-rosate

♀ adulta a differenza del maschio ha dorso marrone




collo lungo e aspetto molto slanciato ed esile

adulto



giovane




## Pivieressa - Grey Plover (*Pluvialis squatarola*)

poco frequente

Lunghezza: 27-30 cm, apertura alare: 71-83 cm

adulti in abito estivo con  
parti superiori biancastre  
macchiate di nero e  
marrone




zampe  
corte  
nerastre

becco corto  
e nerastro

faccia, guance,  
gola e petto neri  
bordati di  
bianco, addome  
nero




ascelle  
nere in ogni  
piumaggio



in inverno gregaria



adulti in abito invernale  
con parte inferiori bianche  
(ad eccezione delle ascelle  
che sono nere)



## Piviere dorato - Golden Plover (*Pluvialis apricaria*)

poco frequente

Lunghezza: 26-29 cm, apertura alare: 67-76 cm

adulti in abito estivo parti superiori screziate di giallo oro, bianco e nero



becco corto e nerastro

faccia, guance, gola, petto e addome nero bordato di bianco



ascella sempre bianca visibile in volo

in abito invernale addome e ventre biancastri, petto, gola e guance fulve



zampe scure e corte

sottoala, specialmente vicino al corpo, bianca



in inverno gregario



## Piviere tortolino - Dotterel (*Charadrius morinellus*)

poco frequente

Lunghezza: 23-26 cm, apertura alare: 60-72 cm

adulti in abito estivo con  
evidente sopracciglio  
bianco che arriva fino alla  
nuca

Foto G. & M. Sighele



colori più  
vivaci nelle  
♀♀

adulti in abito estivo  
con banda bianca  
sottile sul petto e  
addome rossiccio che  
sfuma al nero verso il  
ventre



giovani con colori  
molto più smorti e  
banda sul petto molto  
poco marcata



zampe giallo  
verdi

adulti in inverno simili  
ai giovani



in volo parti  
superiori  
senza strie o  
bande alari  
evidenti

adulto in abito  
di transizione



## Corriere grosso - Common Ringed Plover (*Charadrius hiaticula*)

poco frequente

Lunghezza: 18-20 cm, apertura alare: 48-57 cm

adulti con tipico disegno bianco e nero sul capo e grossa banda nera sul petto che assottigliandosi arriva fino alla nuca

nessun anello perioculare



adulto in estate

coda bordata di bianco



banda alare bianca ben visibile

sopracciglio bianco evidente



adulto in inverno



individuo in abito invernale



giovane

gregario in inverno e durante le migrazioni



## Corriere piccolo - Little Ringed Plover (*Charadrius dubius*)

diffuso

Lunghezza: 14-15 cm, apertura alare: 42-48 cm

adulti con tipico disegno  
bianco e nero sul capo e  
stretta banda nera sul petto

occhi con  
evidente rima  
palpebrale  
gialla



♂ in estate

zampe rosa  
carnicino



nessuna barra  
alare evidente  
in volo



individuo in  
inverno

becco corto  
e nero



giovane in volo  
con solo accenno  
di barra alare  
bianca



♀ in estate



il corriere grosso  
ha barra alare  
evidente

## Fratino - Kentish Plover (*Charadrius alexandrinus*)

poco frequente

Lunghezza: 15-17 cm, apertura alare: 42-45 cm

♂ in abito con barra su fronte, fascia dietro l'occhio, semicollare neri su sfondo bianco; nuca e parte del vertice fulvi



♂ estate

becco nero  
corto

in volo barra  
alare sempre  
ben visibile



coda marrone  
al centro e  
bianca ai lati

♀ con assenza  
di fasce nere  
su capo, collo  
e petto



zampe  
nere di  
lunghezza  
media

♂ in tarda  
estate



gregario soprattutto  
al di fuori del  
periodo riproduttivo

## Pavoncella - Northern Lapwing (*Vanellus vanellus*)


diffusa

Lunghezza: 28-31 cm, apertura alare: 82-87 cm

ciuffo  
evidente  
specie nei ♂♂

ali arrotondate  
bianche e nere

♂  
adulti e giovani con corpo  
superiormente verde scuro  
con riflessi metallizzati di  
vario colore



sottocoda e  
zampe  
arancioni





coda sopra bianca  
con terminale nero  
e base arancione

gregaria  
specialmente  
in inverno



giovane



♀

## Chiurlo piccolo - Eurasian Whimbrel (*Numenius phaeopus*)

poco frequente

Lunghezza: 40-42 cm, apertura alare: 76-89 cm


adulti e giovani con corpo screziato di marrone su parti superiori e petto



zampe abbastanza lunghe azzurro-grigio

becco discretamente lungo e ricurvo verso il basso (con curvatura più accentuata verso la punta) e non sottilissimo

sopracciglio e stria su vertice chiari ed evidenti



groppone bianco, coda fittamente barrata e nessuna barra alare



gregario durante le migrazioni



il chiurlo maggiore è privo di strie e sopraccigli evidenti



## Chiurlo maggiore - Curlew (*Numenius arquata*)

diffuso

Lunghezza: 50-60 cm, apertura alare: 80-100 cm

adulti e giovani con corpo  
screziato di marrone su  
parti superiori e petto



becco molto lungo e  
ricurvo verso il basso  
che si assottiglia verso la  
punta

zampe lunghe  
azzurro-grigio



disegno su capo senza  
sopracciglio o stria su  
vertice evidenti

groppone bianco, coda  
fittamente barrata e  
nessuna barra alare



gregario soprattutto  
durante l'inverno

## Pittima minore - Bar-tailed Godwit (*Limosa lapponica*)

poco frequente

Lunghezza: 37-39 cm, apertura alare: 70-80 cm

Foto M. & G. Sighele



adulti in abito estivo con  
capo, collo, petto e parte  
dell'addome arancio-rosso

zampe che sporgono  
poco oltre la coda





Foto M. Cargasacchi

becco lungo e  
lievemente  
piegato all'insù



zampe scure

adulti in abito invernale  
molto più screziati con  
tonalità sul marrone e  
bianco sporco

barra alare appena  
accennata

groppone bianco che  
sfuma verso coda con fitte  
barrature



## Pittima reale - Black-tailed Godwit (*Limosa limosa*)

diffusa

Lunghezza: 40-44 cm, apertura alare: 70-82 cm

adulti in abito estivo con collo e capo rosso arancio e sopracciglio più chiaro




zampe lunghe  
nerastre

becco lungo dritto  
arancione e nero  
verso la punta



in volo ben visibili  
ampia barra alare  
bianca e coda bianca  
con ampia banda  
terminale nera



adulto in abito di  
transizione



la pittima minore  
non ha barre alari  
evidenti e coda  
barrata

gregaria durante le  
migrazioni e  
d'inverno



## Voltapietre - Ruddy Turnstone - (*Arenaria interpres*)

poco frequente

Lunghezza: 22-24 cm, apertura alare: 50-57 cm

adulti in abito estivo con parti superiori nere e arancioni, petto nero, capo bianco con bande nere e screziato di marrone sul vertice



zampe corte  
arancioni

becco  
corto, nero  
e appiattito  
in punta

in abito  
invernale ali  
marroni  
screziate di  
nero con due  
ampie barre  
alari bianche

coda con base  
bianca e nera  
all'estremità con  
sottile bordatura  
bianca




dorso con banda  
bianca

adulto in abito  
invernale



giovane



gregario in inverno e  
durante le migrazioni



## Piovanello maggiore - Knot (*Calidris canutus*)

poco frequente

Lunghezza: 23-25 cm, apertura alare: 57-61 cm

adulti in abito estivo con  
capo, petto, fianchi e  
addome rosso arancio



coda  
fittamente  
barrata


collo corto  
e aspetto  
tozzo



becco di media  
lunghezza e  
lievemente  
curvo verso il  
basso

barra alare  
bianca

Foto F. Piccolo



zampe  
giallo verde  
corte

adulti in abito invernale



gregario in migrazione ed in inverno (nella  
foto con alcuni piovanelli tridattili)



## Combattente - Ruff (*Calidris pugnax*)

diffuso

Lunghezza: 20-30 cm, apertura alare: 48-58 cm

♂♂ adulti in abito nuziale  
con colori molto variabili  
tra petto, collo e capo



♂♂ in abito nuziale

becco di lunghezza  
media e lievemente  
curvo all'ingù



in volo visibile  
barra alare sottile e  
coda con fascia  
bianca a "U"



♀♀ molto più  
piccole dei ♂♂

becco e zampe  
di colore  
variabile



♀ adulta

in entrambi i  
sessi tipico il  
disegno delle  
penne orlate di  
chiaro sul dorso

in alimentazione spesso  
con aspetto "arruffato"



giovane



gregario in  
migrazione e  
inverno

**Gambecchio frullino - Broad-billed Sandpiper (*Calidris falcinellus*)**

poco frequente

Lunghezza: 15-18 cm, apertura alare: 35-40 cm

dorso molto striato



zampe  
verdastre

collo e zampe  
abbastanza corti, becco  
di media lunghezza con  
zona apicale piegata  
leggermente all'ingiù

Foto S. Huetting

capo con doppio  
sopracciglio bianco



coda marrone al  
centro e  
all'estremità,  
bianca ai lati



barra alare  
visibile

Foto L. Kislev

## Piovanello comune - Curlew Sandpiper (*Calidris ferruginea*)

poco frequente

Lunghezza: 18-19 cm, apertura alare: 42-46 cm

adulti in abito estivo con capo, collo, petto ed addome rosso arancio



becco discretamente lungo e arcuato verso il basso


adulti in abito invernale molto simile ai giovani ma senza sfumature fulve su petto

in volo visibile barra alare



adulto in abito nuziale quasi completo

adulto in inverno



zampe di media lunghezza nerastre

coda bianca con terminazione grigio scuro in abito invernale e barrata in abito estivo



giovane



gregario durante le migrazioni




## Gambecchio nano - Temminck's Stint (*Calidris temminckii*)

poco frequente

Lunghezza: 13-15 cm, apertura alare: 34-37 cm

coda lunga più della  
proiezione delle  
remiganti



zampe  
verde  
chiaro

becco piuttosto  
corto e con lieve  
curvatura verso il  
basso

coda bianca con  
fascia marrone  
centrale che si  
unisce al groppone



adulti in abito invernale  
prevalentemente marroni  
screziati superiormente e  
biancastri su addome e  
ventre



barra alare evidente



il gambecchio comune ha  
la coda nella parte  
terminale con grigio ai  
lati



discretamente gregario in  
inverno e durante le migrazioni

## Piovanello tridattilo - Sanderling (*Calidris alba*)

poco frequente

Lunghezza: 20-21 cm, apertura alare: 40-45 cm

adulto in primavera, molto colorato e screziato sopra



banda alare ben visibile, coda grigio-nerastra al centro, bianca ai lati e grigia all'estremità



becco e zampe corti e neri

adulto in inverno, colorazione molto chiara grigio-bianca



macchia nera spesso visibile sulla spalla nel piumaggio invernale



giovane

gregario in inverno e durante le migrazioni




## Piovanello pancianera - Dunlin (*Calidris alpina*)

diffuso

Lunghezza: 16-20 cm, apertura alare: 38-43 cm

adulti in abito estivo corpo  
screziato di fulvo  
superiormente e con addome  
nero inferiormente

becco abbastanza  
lungo e curvo verso  
il basso




zampe  
corte e  
nere



in volo barra alare visibile e  
coda nerastra con lati bianchi  
e grigia all'estremità



adulti in abito  
invernale  
marrone  
omogeneo  
superiormente  
e bianco  
inferiormente



gregario in inverno ed in  
migrazione; forma stormi  
anche di migliaia di  
individui

## Gambecchio comune - Little Stint (*Calidris minuta*)


diffuso

Lunghezza: 12-14 cm, apertura alare: 34-37 cm

adulti in abito estivo con  
capo, collo e alto petto  
rossastri; molto screziato  
di fulvo sul dorso



adulto in abito invernale



zampe  
corte  
nerastre


barra alare  
visibile

coda scura al  
centro, bianca  
ai lati e grigia  
all'estremità



becco corto e  
nero

adulto in  
tarda estate



gregario in  
migrazione ed  
in inverno


**Piovanello pettorale - Pectoral Sandpiper (*Calidris melanotos*)**

raro

Lunghezza: 19-23 cm, apertura alare: 38-44 cm

parti superiori marroni  
screziati di chiaro

becco di media lunghezza,  
curvo lievemente verso il  
basso, marrone alla base e  
nerastro all'estremità



petto evidentemente  
striato e nettamente  
demarcato verso  
l'addome bianco

coda con due  
aree bianche ai  
lati



barra alare  
accennata



sopracciglio chiaro  
abbastanza evidente

## Beccaccia - Woodcock (*Scolopax rusticola*)

diffusa

Lunghezza: 33-35 cm, apertura alare: 56-60 cm

adulti e giovani con corpo prevalentemente marron screziato di chiari/scuri

di abitudini crepuscolari e schive, molto mimetica

becco abbastanza lungo e dritto

Foto F. Piccolo

zampe corte

volo di spostamento lento

nessun segno evidente su coda, groppone o dorso

nessuna barra alare

## Crocolone - Great Snipe (*Gallinago media*)

molto raro

Lunghezza: 27-29 cm, apertura alare: 47-50 cm

individui molto mimetici  
marroni con screziature e  
strie beige, nere e  
biancastre



becco lungo  
grigio-nero

addome  
lunettato

rispetto al  
beccaccino volo  
più basso e  
dritto;  
corporatura più  
massiccia

vistose  
barre alari  
bianche  
visibili  
anche da  
posato



nessuna banda  
bianca sul  
bordo  
posteriore  
alare

molto bianco ai lati  
della coda visibile  
soprattutto a coda  
aperta



il beccaccino ha una  
barra bianca evidente  
sul bordo posteriore  
alare

## Beccaccino - Common Snipe (*Gallinago gallinago*)

diffuso

Lunghezza: 25-27 cm, apertura alare: 44-47 cm

parti superiori, collo,  
petto e capo marroni  
screziati di chiari/scuri

becco  
molto lungo  
e dritto

per alimentarsi  
conficca anche  
profondamente il  
becco nella melma

zampe  
verdastre


barra alare  
piccola e poco  
visibile

bordo bianco  
sull'ala  
posteriormente

adulto in volo di  
parata

quando si invola di norma  
fa versi di allarme e vola  
a zig-zag

anche gregario  
in migrazione  
ed in inverno



## Frullino - Jack Snipe (*Lymnocyptes minimus*)

poco frequente

Lunghezza: 17-19 cm, apertura alare: 38-42 cm

colorazione molto  
mimetica, becco  
abbastanza lungo



quando si alimenta  
usa ondeggiare con  
continui piegamenti  
sulle zampe

zampe abbastanza  
corte verdastre



al centro del  
vertice è presente  
una stria scura

in volo nessuna barra  
alare o disegni  
particolari sulla coda



in genere si invola solo a  
circa un metro di  
distanza prima di essere  
calpestato ed in  
silenzio, posandosi a  
breve distanza

Foto M. Cargasacchi

**Falaropo beccosottile - Red-necked Phalarope (*Phalaropus lobatus*)**

raro

Lunghezza: 18-19 cm, apertura alare: 32-41 cm

le ♀♀ adulte in abito estivo hanno corpo prevalentemente grigio sopra con strie ocra e biancastro inferiormente.

♀ adulta in abito estivo




zampe abbastanza corte e nerastre

gola bianca e fascia arancione che va dalla nuca alla parte alta del petto

becco di media lunghezza, nero e sottile

in volo mostra una evidente barra alare bianca



♀ adulta

♂ adulto in abito estivo mentre cattura un insetto



♂♂ adulti in abito estivo sono simili alle femmine ma con tonalità più smorte

si alimentano spesso nuotando e talvolta in gruppo



adulto in abito invernale



## Falaropo beccolargo - Grey Phalarope (*Phalaropus fulicarius*)

raro

Lunghezza: 20-22 cm, apertura alare: 40-44 cm

♀♀ adulte in abito estivo con corpo,  
collo e guance rosso-arancio e  
bianco sopra, sotto e dietro l'occhio;  
♂♂ con colori più smorti

becco giallo  
arancio con  
punta nera,  
abbastanza  
corto e  
grosso

Foto F. Cimino



♂ adulto in abito  
estivo



Foto F. Cimino



individuo in abito  
invernale

in volo sempre ben  
visibile una barra  
alare bianca



il falaropo beccosottile  
in abito estivo ha il capo  
con un disegno diverso



## Piro piro del Terek - Terek Sandpiper (*Xenus cinereus*)

raro

Lunghezza: 22-24 cm, apertura alare: 57-59 cm

adulti con abito grigiastro  
superiormente e bianco  
inferiormente

becco lungo curvo  
all'insù, arancione  
alla base e  
nerastro  
all'estremità

Foto L. Sattin



zampe arancioni  
di media  
lunghezza

coda grigia

bordo posteriore  
alare bianco



parte anteriore  
esterna dell'ala  
scura

Foto L. Sattin

## Piro piro piccolo - Common Sandpiper (*Actitis hypoleucos*)

diffuso

Lunghezza: 19-21 cm, apertura alare: 38-41 cm


adulti e giovani molto simili con parti superiori marroni con macchiature scure, parti inferiori bianche

becco di lunghezza media nerastro e dritto

spazio bianco tra petto e ala

ali inferiormente bianche e marroni

zampe abbastanza corte



durante le migrazioni talvolta si osservano raggruppamenti radi di qualche decina di individui

coda marrone al centro bordata di bianco soprattutto ai lati

specie perlopiù solitaria con individui che spesso si inseguono e si scacciano

in volo ben visibile barra alare bianca




## Piro piro culbianco - Green Sandpiper (*Tringa ochropus*)

diffuso

Lunghezza: 21-24 cm, apertura alare: 57-61 cm

adulti e giovani molto simili, marrone scuro superiormente e bianco inferiormente



zampe verdastre abbastanza lunghe

sopracciglio dall'occhio al becco

becco abbastanza lungo e nerastro

coda bianca alla base e con grosse barre verso l'estremità



ali sopra e sotto nerastre senza barre alari

piro piro boschereccio

piro piro culbianco



forti contrasti tra le parti superiori scure e le parti inferiori bianche



## Totano moro - Spotted Redshank (*Tringa erythropus*)

diffuso

Lunghezza: 29-31 cm, apertura alare: 61-67 cm




adulti in abito estivo con  
corpo, collo e capo neri

becco lungo  
nero con base  
arancio-rossa  
nella parte  
inferiore vicino  
alla base

in volo nessuna  
barra alare  
visibile



gregario in inverno e  
durante le migrazioni



coda biancastra  
fittamente  
barrata di  
marrone

adulto in abito  
di transizione



in abito invernale  
è presente un  
evidente  
sopracciglio  
bianco

adulto in abito invernale  
mentre nuota; l'abito è  
prevalentemente grigio  
superiormente e  
biancastro inferiormente




la pettegola ha un  
ampio bordo bianco  
nella parte  
posteriore dell'ala

## Pantana - Greenshank (*Tringa nebularia*)

diffusa

Lunghezza: 30-33 cm, apertura alare: 68-70 cm



zampe  
lunghe  
verdastre

adulti grigio-marroni  
superiormente  
spruzzati di bianco e  
con capo, collo e  
petto biancastri  
striati di marron

becco lungo,  
robusto e piegato  
all'insù, appare  
quasi "spezzato"



giovani  
molto simili  
agli adulti

area bianca  
tra groppone  
e schiena



ali inferiormente  
biancastre al centro con  
screziature marroni-  
grigie e marroni alle  
estremità



ali senza  
barre

coda bianca  
fittamente  
barrata di  
marrone

l'albastrello è di  
forme più snelle e  
becco sottile,  
allungato e diritto




gregaria durante  
migrazioni e  
svernamento

## Pettegola - Common Redshank (*Tringa totanus*)

diffusa

Lunghezza: 27-29 cm, apertura alare: 59-66 cm

adulti con parti superiori  
marroni screziate di scuro,  
parti inferiori biancastre  
macchiettate di scuro



becco lungo  
arancio alla  
base e  
nerastro  
all'estremità

zampe  
lunghe  
arancioni

coda  
screziata di  
marrone

area bianca  
tra  
gropone e  
schiena




specie gregaria al di fuori  
del periodo riproduttivo



bordo  
posteriore  
dell'ala  
bianco

sottoala  
chiaro



il totano moro  
non ha bordo  
posteriore  
bianco sull'ala

## Piro piro boschereccio - Wood Sandpiper (*Tringa glareola*)

diffuso

Lunghezza: 19-21 cm, apertura alare: 56-57 cm

adulti con parti superiori  
marroni spruzzate di  
bianco; parti inferiori  
biancastre striate di  
marrone



sopraciglio dal  
becco fino a dietro  
all'occhio

becco di  
lunghezza  
media e  
nerastro

giovani molto simili  
agli adulti



il piro piro culbianco è  
più contrastato tra parti  
superiori e inferiori

parti superiori scure  
che sfumano  
gradualmente verso  
il biancastro di  
addome e ventre



coda bianca alla  
base e con barre  
verso l'estremità

nessuna barra  
alare

ali sotto marroni  
ma con molto  
bianco  
soprattutto nelle  
parti vicino al  
corpo




discretamente gregario  
durante le migrazioni

## Albastrello - Marsh Sandpiper (*Tringa stagnatilis*)

poco frequente

Lunghezza: 22-24 cm, apertura alare: 55-59 cm

adulti marroni  
superiormente  
macchiettati di scuro,  
parti inferiori biancastre  
con macchiettature scure



zampe molto  
lunghe verdastre

becco nerastro  
lungo e molto  
sottile


nessuna barra alare

coda biancastra  
barrata di marrone



area bianca tra  
coda e schiena

forme snelle e  
movimenti  
aggraziati



la pantana è più  
tozza con becco più  
grosso e piegato  
sensibilmente  
all'insù, come fosse  
spezzato

## Pernice di mare - Collared Pratincole (*Glareola pratincola*)

poco frequente

Lunghezza: 25 cm, apertura alare: 60-65 cm

adulti in abito estivo  
superiormente marrone  
con gola crema e linea  
nera che scende dagli  
occhi fino alla gola



corto becco  
uncinato  
nero con  
base rossa




gropone bianco

i giovani hanno un  
mantello  
"squamato"



ali superiormente  
marroni

piuttosto gregaria  
nidifica in colonie



parti inferiori  
delle ali vicino al  
corpo rosso  
mattone



coda molto  
forcuta

## Specie irregolari

molto rare

**Pavoncella gregaria**  
**Sociable Plover**  
***Vanellus gregarius***



**Piovanello violetto**  
**Purple Sandpiper**  
***Calidris maritima***



**Piro piro fulvo**  
**Buff-breasted Sandpiper**  
***Calidris subruficollis***



---

## Specie irregolari

molto rare

**Corrione biondo**  
**Cream-colored Courser**  
***Cursorius cursor***



Foto M. & G. Sighele

## Alcune specie accidentali

molto rare

Corriere di Leschenault  
Greater Sand Plover  
*Charadrius leschenaultii*



Pavoncella armata  
Spur-winged Lapwing  
*Vanellus spinosus*



Pavoncella cenerina  
Grey-headed Lapwing  
*Vanellus cinereus*



Foto F. Cimino

## Alcune specie accidentali

molto rare

**Pavoncella codabianca**  
**White-tailed Plover**  
***Vanellus leucurus***



**Totano zampegiale minore**  
**Lesser Yellowlegs**  
***Tringa flavipes***



Foto F. Piccolo

**Pernice di mare orientale**  
**Black-winged Pratincole**  
***Glareola nordmanni***



## Indice

Introduzione 2

### *Charadriiformes*

#### *Burhinidae*

Occhione 3

#### *Haematopodidae*

Beccaccia di mare 4

#### *Recurvirostridae*

Avocetta 5

Cavaliere d'Italia 6

#### *Charadriidae*

Pivieressa 7

Piviere dorato 8

Piviere tortolino 9

Corriere grosso 10

Corriere piccolo 11

Fratino 12

Pavoncella 13

#### *Scolopacidae*

Chiurlo piccolo 14

Chiurlo maggiore 15

Pittima minore 16

Pittima reale 17

Voltapietre 18

Piovanello maggiore 19

Combattente 20

Gambecchio frullino 21

Piovanello comune 22

Gambecchio nano 23

Piovanello tridattilo 24

Piovanello pancianera 25

Gambecchio comune 26

Piovanello pettorale 27

Beccaccia 28

Croccolone 29

Beccaccino 30

Frullino 31

Falaropo beccosottile 32

Falaropo beccolargo 33

Piro piro del Terek 34

Piro piro piccolo 35

Piro piro culbianco 36

Totano moro 37

Pantana 38

Pettegola 39

Piro piro boschereccio 40

Albastrello 41

#### *Glareolidae*

Pernice di mare 42

Specie irregolari

Pavoncella gregaria 43

Piovanello violetto 43

Piro piro fulvo 43

Corrione biondo 44

Alcune specie accidentali

Corriere di Leschenault 45

Pavoncella armata 45

Pavoncella cenerina 45

Pavoncella codabianca 46

Totano zampegialle minore 46

Pernice di mare orientale 46



**Venezia Birdwatching** [www.veneziabirdwatching.eu](http://www.veneziabirdwatching.eu)

Ulteriori informazioni sugli uccelli del Veneto: [www.birdingveneto.eu](http://www.birdingveneto.eu)

