

Guida all'identificazione dei rapaci diurni

pandionidi, accipitridi e falconidi



Emanuele Stival



Introduzione

Questa pubblicazione tratta delle specie presenti in Italia; ne sono state tralasciate solo alcune di accidentali. Le schede non sono esaustive, ma riportano le foto e le peculiarità maggiormente utili al riconoscimento. Le dimensioni delle varie specie sono tratte da Svensson L., Grant P.J., Mullarney K. & Zetterstrom D. - Guida degli Uccelli d'Europa, Nord Africa e Vicino Oriente Terza edizione. - Ricca editore. L'ordine sistematico dei taxa segue: E. Stival & M. Sighele - Atlante FotoSonoro degli Uccelli del Veneto - ed. 2019 con l'aggiunta di una specie, l'aquila di Bonelli. (<https://www.birdingveneto.eu/atlasven2019/index.html>).

E' riportata in ogni scheda una categoria di frequenza come utilizzato in www.ornitho.it

Abbreviazioni usate:

♂	maschio adulto
♀	femmina adulta
imm.	immaturo
juv.	giovane
ad.	adulto

Tutti i diritti riservati. E' vietata la copia, la riproduzione anche parziale, la stampa del presente lavoro senza il consenso dell'autore. E' permesso l'uso personale o scolastico senza fini di lucro.

Le foto, se non diversamente indicato sono di Emanuele Stival.

Ringraziamenti

Un particolare grazie va a Tomaso Bisol, Angelo Nardo, Giorgio Paesani e Alessandro Paiusco per la revisione del lavoro. Per aver reso disponibili le loro foto: Ketty Benozzi, Nicholas Ciarla, Fabrizio Cimino, Tullio Iacopetti, Maurizio Limarilli, Giuseppe Nassi, Angelo Nardo, Graziano Nicola, Fabio Piccolo, Giacomo Sighele, Maurizio Sighele, Aldo Tonelli.

Foto di copertina: nibbio reale

Foto in retro copertina: gheppio, nibbio bruno e falco cuculo

Venezia - luglio 2022

Falco pescatore - Osprey (*Pandion haliaetus*)

poco frequente


Lunghezza: 52-60 cm, apertura alare: 152-167 cm



ad.

macchie
carpali
scure

capo bianco con stria
nera attraverso l'occhio,
ali strette e allungate;
collarino marrone e
ventre bianco che si
estende alla parte
centrale anteriore delle
ali



juv.



plana con ali dritte e arcuate



ad.



fa spesso lo "spirito santo" e si tuffa
per catturare le prede con zampe
protese

Nibbio bianco - Black-winged Kite (*Elanus caeruleus*)

molto raro

Lunghezza: 31-36 cm, apertura alare: 76-88 cm

adulti bianchi
inferiormente e grigi
superiormente con parte
anteriore-centrale
dell'ala nera

ad.



coda squadrata



ad.

juv.



occhi rossi su
sfondo nerastro



Foto M. & G. Sighele



ad.

Gipeto - Bearded Vulture (*Gypaetus barbatus*)

raro

Lunghezza: 105-125 cm, apertura alare: 235-275 cm

molto grande con ali molto lunghe, scuro superiormente; adulti con corpo e capo color crema; fascia nera dall'occhio fino al baffo sul becco

Foto F. Cimino



ad.

Foto F. Cimino



ad.

Foto M. Limarilli



imm.

Foto M. & G. Sighele



coda lunga a cuneo

Foto M. Limarilli



ad.

viste da sotto e sopra

Foto K. Benozzi



Capovaccaio - Egyptian Vulture (*Neophron percnopterus*)

raro

Lunghezza: 55-65 cm, apertura alare: 155-170 cm

adulti bianco sporco con
estremità e parte
posteriore delle ali nere;
parte senza penne sul
capo gialla con apice del
becco nero



coda a
cuneo



ad.



ad.



juv.

giovani marrone
scuro con parti
nude azzurre

ad.




Falco pecchiaiolo - European Honey Buzzard (*Pernis apivorus*)

diffuso

Lunghezza: 52-59 cm, apertura alare: 113-135 cm


capo ben sporgente da
"piccione", piumaggio
molto variabile, in genere
con barrature ben
distinte su ali e coda

♀



manca di banda
pettorale
chiara ad "U"
(a differenza
della poiana)

♂



in volteggio ali piatte



in planata ali leggermente
piegate verso il basso

ad.



♂



juv.



Grifone - Eurasian Griffon Vulture (*Gyps fulvus*)

Lunghezza: 95-110 cm, apertura alare: 230-265 cm

raro

molto grande, ali ampie e larghe con copritrici più chiare delle remiganti e con "dita" lunghe



ad.



juv.

giovani con collarino bruno chiaro



ad.



in volteggio e scivolata con ali appena rialzate a "V"

Avvoltoio monaco - Black Vulture (*Aegypius monachus*)

raro

Lunghezza: 100-115 cm, apertura alare: 250-285 cm



imm.

molto grande, con ali squadrate e profilo alare posteriore "dentellato"

appare molto scuro, ali lunghe e aperte "dita", coda corta



imm.



probabile immaturo con adulto e grifoni



imm.



in planata



Biancone - Short-toed Snake Eagle (*Circaetus gallicus*)

diffuso

Lunghezza: 62-69 cm, apertura alare: 162-178 cm



ad.

ali inferiormente in gran parte chiare e senza macchie carpali, ventre chiaro



fa spesso lo "spirito santo"




capo grosso evidente da posato



imm.



imm.



Aquila anatraia minore - Lesser Spotted Eagle (*Clanga pomarina*)


rara

Lunghezza: 55-65 cm, apertura alare: 143-168 cm

dita
abbastanza
lunghe

in gran parte marrone e
nera; ali con copritrici
più chiare delle remiganti

Foto A. Nardo



imm.

doppia
"virgola"
chiara



juv.

Foto A. Nardo

Foto M. & G. Sighele



ad.

juv.



Foto A. Nardo

Aquila anatraia maggiore - Greater Spotted Eagle (*Clanga clanga*)

rara

Lunghezza: 59-69 cm, apertura alare: 153-177 cm



Aquila minore - Booted Eagle (*Hieraetus pennatus*)

poco frequente

Lunghezza: 42-51 cm, apertura alare: 110-135 cm



morfismo
chiaro



morfismo
scuro

le varianti scure
hanno una banda
medio alare scura



6 "dita" visibili



angoli coda spigolosi



bande chiare sul sopra
ala e spalline bianche

Aquila imperiale - Eastern Imperial Eagle (*Aquila heliaca*)

rara

Lunghezza: 70-83 cm, apertura alare: 175-205 cm

gli adulti hanno copritrici scure e sono superiormente scuri con macchie bianche su dorso; capo bruno chiaro



ad.



ad.



ad.

juv.



ad.



juv.



Foto M. & G. Sighele

Aquila reale - Golden Eagle (*Aquila chrysaetos*)

Lunghezza: 80-93 cm, apertura alare: 190-225 cm

poco frequente



adulti hanno parte superiore del capo e nuca dorati

Foto G. Nassi

subadulto



subadulto



Foto F. Cimino

ad.

in volteggio tiene le ali a "V"



Foto F. Cimino

imm.

immaturi hanno ampie aree bianche su ali e coda



Foto F. Piccolo



ad.

Aquila di Bonelli - Bonelli's Eagle (*Aquila fasciata*)

rara

Lunghezza: 55-65 cm, apertura alare: 145-165 cm



♂



♀

negli adulti ampia
macchia carpale e banda
alare nera

negli adulti ampia banda
terminale nera sulla coda

adulti con macchia
bianca sulla schiena ben
visibile



juv.

“virgola”
carpale

barratura fitta e
regolare sulla coda
dei giovani

Foto A. Nardo

Sparviere - Eurasian Sparrowhawk (*Accipiter nisus*)

molto diffuso

Lunghezza: 29-41 cm, apertura alare: 58-80 cm

ali arrotondate, parti inferiori barrate, ♂♂ con auricolari e petto arancio

♀



capo arrotondato

coda spigolosa



♀

juv. ♀



♀ in discesa rapida



♂


tarsi gracili



Astore - Northern Goshawk (*Accipiter gentilis*)

diffuso

Lunghezza: 49-64 cm, apertura alare: 90-120 cm



♂

coda arrotondata

ali arrotondate, capo "appuntito"

adulti con parti inferiori barrate

♂ sopra bluastro



Foto G. Nassi



♂

giovani con ventre striato




Foto G. Nassi

Foto F. Cimino



♀

tarsi robusti

juv.

Falco di palude - Western Marsh Harrier (*Circus aeruginosus*)

diffuso

Lunghezza: 43-55 cm, apertura alare: 115-140 cm

ali lunghe ben digitate,
♂ con sottoala chiaro,
estremità scure e corpo
rossiccio



♀♀ molto variabili,
talvolta scure
inferiormente come i
giovani



in scivolata e volteggio
tiene le ali a "V"

juv.



Albanella reale - Hen Harrier (*Circus cyaneus*)

poco frequente

Lunghezza: 45-55 cm, apertura alare: 97-118 cm

♂ grigi sopra e bianchi sotto con estremità alari nere



♂

marginie scuro lungo l'ala



♀ barrate inferiormente e striate su petto

fascia bianca sul sopracoda in tutti gli individui



juv.

juv.



caccia volando bassa alternando scivolate con ali a "V"



numero remiganti visibili
albanella reale (4) albanella minore (3)



Albanella pallida - Pallid Harrier (*Circus macrourus*)

rara

Lunghezza: 40-50 cm, apertura alare: 97-118 cm



♂ grigi sopra e bianchi sotto con estremità alari con nero non esteso

giovani e ♀♀ molto simili prevalentemente marroni



piccola fascia bianca su sopracoda

juv.



imm. ♀

collarino chiaro ben visibile nei giovani

Foto N. Ciarla



albanella minore



albanella pallida

← testa di giovani



in caccia e scivolata tiene le ali a "V"



imm. ♀

albanella pallida

albanella minore

albanella reale

estensione del nero alle estremità alari delle albanelle ♂♂



Albanella minore - Montagu's Harrier (*Circus pygargus*)

poco frequente

Lunghezza: 39-50 cm, apertura alare: 97-118 cm


♂♂ grigi con
estremità alari e
barra neri

♂



♀♀ con
copritrici
ascellari
barrate

♀



piccola fascia bianca
su sopracoda

♂



in caccia e
scivolata tiene le
ali a "V"

juv.




numero remiganti visibili
albanella reale (4) albanella minore (3)



Nibbio reale - Red Kite (*Milvus milvus*)

poco frequente

Lunghezza: 61-72 cm, apertura alare: 140-165 cm



ad.


giovani simili agli
adulti



ad.

capo grigio

coda molto forcuta,
chiara sotto e rossastra
sopra



ad.

ampia "finestra"
molto chiara verso
l'estremità alare



in scivolata tiene ali
arcuate e un po' a "V"



Nibbio bruno - Black Kite (*Milvus migrans*)


diffuso

Lunghezza: 48-58 cm, apertura alare: 130-155 cm



adulti e giovani
con corpo e ali
poco contrastati

“finestra” più
chiara verso
l'estremità alare



Aquila di mare - White-tailed Eagle (*Haliaeetus albicilla*)

rara

Lunghezza: 76-92 cm, apertura alare: 190-240 cm

molto grande con
becco massiccio,
ali con "dita"
lunghe, coda
cuneata

ad.

immaturi e
giovani con coda
parzialmente
scura

imm.

Foto F. Piccolo

adulti
con coda
bianca

in scivolata con
ali arcuate

ad.

Foto M. & G. Sighele



Foto F. Cimino

ad.

Poiana calzata - Rough-legged Buzzard (*Buteo lagopus*)

rara

Lunghezza: 49-59 cm, apertura alare: 125-148 cm



i ♂ hanno due
o più bande
terminali
caudali

in scivolata tiene ali arcuate



imm.



Poiana codabianca - Long-legged Buzzard (*Buteo rufinus*)

rara

Lunghezza: 50-58 cm, apertura alare: 130-155 cm

imm.



ad.



imm.



caratteristico il pattern
chiaro delle copritrici
mediane e la "mano"
che contrasta con il
resto dell'ala

Foto F. Cimino

in volteggio tiene
le ali a "V"



coda rossiccia cannella
con base chiara e
finemente barrata

imm.



Foto T. Iacopetti

ampia "finestra"
chiara verso
l'estremità dell'ala, più
marcata nei juv.



Poiana - Common Buzzard (*Buteo buteo*)

molto diffusa


Lunghezza: 48-56 cm, apertura alare: 110-130 cm



ad.

tipica "U" sul petto
quasi sempre
visibile, testa
grossa, corta e
arrotondata; banda
medio alare in tutte
le età

adulti con
barrature sul
ventre e ampia
banda terminale
scura sulle ali



juv.



talvolta fa lo
"spirito santo"



in planata ali
piatte



giovani con parti
inferiori striate



in volteggio tiene
le ali a "V" e coda
ben aperta



juv. (chiaro)


Grillaio - Lesser Kestrel (*Falco naumanni*)

poco frequente


Lunghezza: 27-33 cm, apertura alare: 63-72 cm

ali appuntite e colori superiori
camoscio al centro senza gocciolatura
scura e grigio attorno nel ♂

mustacchio
assente o
appena
accennato



imm.



♂

unghie spesso
chiare




♀♀ e juv. molto screziati e
senza grigio



♀

proiezione
remiganti
lunga



♂

fa spesso lo
"spirito santo"

formula alare
grillaio gheppio




Gheppio - Common Kestrel (*Falco tinnunculus*)

Lunghezza: 31-37 cm, apertura alare: 68-78 cm

molto diffuso



proiezione remiganti non lunga



formula alare

grillaio

gheppio



Falco cuculo - Red-footed Falcon (*Falco vespertinus*)

poco frequente

Lunghezza: 28-34 cm, apertura alare: 65-76 cm

♂ adulto prevalentemente
grigio piombo con calzoni
rossi, ♀ crema
inferiormente e nella
maggior parte del capo



♂ ad.



♂ imm.



♀ imm.



♀ ad.

♀ adulta
con doppio
piccolo
mustacchio



♂ ad.



♀ ad.



juv.

giovani con
parti inferiori
striate e
doppio
mustacchio

Falco della regina - Eleonora's Falcon (*Falco eleonora*)

poco frequente

Lunghezza: 36-42 cm, apertura alare: 87-104 cm


ali appuntite, ala
"bicolore" più scura
anteriormente,
mustacchio marcato ma
non grosso

Foto G. Nicola



ad. (chiaro)

Foto G. Nicola



ad. (scuro)

Foto F. Piccolo




imm.

Foto M. & G. Sighele



ad. (chiaro)

Foto A. Tonelli



ad.

Smeriglio - Merlin (*Falco columbarius*)

Lunghezza: 26-33 cm, apertura alare: 55-69 cm

poco frequente

adulti con parti inferiori striate, nel ♂ ocra arancio. ♀♀ superiormente marroni, ♂♂ superiormente grigi con estremità alari scure. Effetto doppio mustacchio sulle guance. ♀♀ simili ai giovani ma barrate meno pesantemente



juv.




Lodolaio - Eurasian Hobby (*Falco subbuteo*)

poco frequente

Lunghezza: 29-35 cm, apertura alare: 70-84 cm

ali appuntite, doppio
mustacchio evidente,
calzoni rossi e parti
superiori grigie (adulti)




ad.



imm.



imm.



ad.



juv.



adulto mentre si
alimenta in volo

giovani striati con sfondo crema
nelle parti inferiori, screziate di
marrone superiormente

Lanario - Lanner Falcon (*Falco biarmicus*)

Lunghezza: 43-50 cm, apertura alare: 95-105 cm

raro

Foto A. Nardo

Foto A. Tonelli

Foto A. Nardo



♂

ali appuntite ma non troppo, mustacchio sottile



juv.

♂

adulti con fianchi barrati, ♂♂ con petto e parte centrale del ventre quasi candidi; ♀♀ vistosamente macchiate dal ventre al collo



giovani con petto striato

juv.

♀



Foto A. Tonelli

Foto A. Nardo

Sacro - Saker Falcon (*Falco cherrug*)


Lunghezza: 47-55 cm, apertura alare: 105-129 cm

raro

ali abbastanza appuntite,
calzari scuri,
prevalentemente marroni
superiormente e striati
inferiormente



ad.



effetto doppio
mustacchio su
guancia




ad.



Falco pellegrino - Peregrine Falcon (*Falco peregrinus*)

diffuso

Lunghezza: 38-51 cm, apertura alare: 89-113 cm



juv.

ali abbastanza
appuntite e colori
superiori grigio-blu o
marroni



♀ più grande del ♂,
aspetto robusto e
massiccio



juv.
(variante)



mustacchio
largo (quasi
sempre)

ad.



juv.

giovani con
parti inferiori
striate



adulti con parti
inferiori barrate

Indice

Introduzione 2

Accipitriformes

Pandionidae

Falco pescatore 3

Accipitridae

Nibbio bianco 4

Gipeto 5

Capovaccaio 6

Falco pecchiaiolo 7

Grifone 8

Avvoltoio monaco 9

Biancone 10

Aquila anatraia
minore 11

Aquila anatraia
maggiore 12

Aquila minore 13

Aquila imperiale 14

Aquila reale 15

Aquila di Bonelli 16

Sparviere 17

Astore 18

Falco di palude 19

Albanella reale 20

Albanella pallida 21



Albanella minore 22



Falco della regina 32



Nibbio reale 23



Smeriglio 33



Nibbio bruno 24



Lodolaio 34



Aquila di mare 25



Lanario 35



Poiana calzata 26



Sacro 36



Poiana codabianca 27



Falco pellegrino 37



Poiana 28



Falconiformes

Falconidae

Grillaio 29



Gheppio 30



Falco cuculo 31





Ulteriori informazioni sugli
uccelli del Veneto:

www.birdingveneto.eu

Venezia Birdwatching

www.veneziabirdwatching.eu

