

# Limicoli

burinidi, hematopodi, recurvirostridi,  
caradridi, scolopacidi e glareolidi



L'associazione Venezia Birdwatching si propone principalmente la diffusione dell'attività di osservazione e di riconoscimento in natura degli uccelli (bird-watching), anche nell'intento di acquisire conoscenze utili per la tutela, valorizzazione e protezione della natura, dell'ambiente e dell'avifauna, della floravegetazione ed altre specie animali (vertebrati e invertebrati), nonché di monitorare le eventuali variazioni delle popolazioni e/o degli ambienti.

Tra le attività principali vi è quella delle uscite sul campo dove si pratica il birdwatching e avviene spesso uno scambio di esperienze, informazioni e metodi sul riconoscimento delle specie e quanto altro possa aiutare la crescita e le competenze dei soci.

Tutti i diritti riservati. E' vietata la copia, riproduzione anche parziale, la stampa del presente lavoro senza il consenso dell'autore. E' permesso l'uso personale o scolastico senza fini di lucro. Testi di @ Emanuele Stival, foto, se non diversamente indicato, di @ Emanuele Stival

Venezia - agosto 2020

In questa mini guida sono trattati i principali limicoli (burinidi, hematopodi, recurvirostridi, caradradi, scolopacidi e glareolidi) che compaiono nel Veneto.

---

## Occhione

L'occhione è presente nel Veneto durante tutto l'anno e anche vi nidifica. Di forme piuttosto compatte con becco corto preferisce gli ambienti aperti fluviali con substrato di sassi; non disdegna i campi coltivati specialmente se ricchi di sassi.

**Lunghezza:** 40-44 cm

**Apertura alare:** 77-85 cm



adulto

---

## Beccaccia di mare

La beccaccia di mare è presente nel Veneto durante tutto l'anno con minori presenze però nei mesi invernali. Di forme piuttosto compatte, bianca e nera con zampe e lungo becco rosso arancio. Preferisce gli ambienti litoranei e salmastri come le lagune.

**Lunghezza:** 40-45 cm

**Apertura alare:** 80-86 cm



adulto



giovane

---

## Cavaliere d'Italia

Il cavaliere d'Italia è presente nel Veneto da primavera a settembre con rare e saltuarie presenze invernali e vi nidifica. Di forme slanciate con zampe lunghissime e becco lungo. Preferisce gli ambienti legati all'acqua dolce e più raramente all'acqua salmastra.

**Lunghezza:** 35-40 cm

**Apertura alare:** 67-83 cm

coppia (♂ a sx)



---

## Avocetta

L'avocetta è presente nel Veneto tutto l'anno e vi nidifica. Di forme abbastanza slanciate con zampe e becco (ricurvo all'insù) lunghi. Preferisce gli ambienti legati all'acqua dolce e più raramente all'acqua salmastra.

**Lunghezza:** 42-45 cm

**Apertura alare:** 77-80 cm



adulto



giovane

---


## Pavoncella

La pavoncella è presente nel Veneto durante tutto l'anno e vi nidifica. Di forme piuttosto compatte con becco e zampe piuttosto corti. Frequenta tutti gli ambienti legati all'acqua dolce, prati umidi e campi coltivati, incolti aridi. Caratteristiche le ali arrotondate alle estremità.

**Lunghezza:** 28-31 cm

**Apertura alare:** 82-87 cm

♂ in estate



giovane



---

## Piviere dorato

Il piviere dorato è presente nel Veneto durante l'inverno e le migrazioni. Di forme piuttosto compatte con becco e zampe corti. Frequenta gli ambienti aperti come prati, campi spogli e stoppie.

**Lunghezza:** 26-29 cm

**Apertura alare:** 67-76 cm



adulto in estate

foto M. & J. Sighele



adulto in abito invernale

---

## Pivieressa

La pivieressa è presente nel Veneto prevalentemente in inverno e durante le migrazioni divenendo molto più rara tra giugno e luglio. Di forme piuttosto normali con becco e zampe corti. Preferisce gli ambienti lagunari dove si alimenta assieme ai piovanelli pancianera.

**Lunghezza:** 27-30 cm

**Apertura alare:** 71-83 cm

adulto in abito  
riproduttivo



adulto in abito  
invernale



---

## Corriere grosso

Il corriere grosso è presente nel Veneto soprattutto durante le migrazioni e in misura minore negli altri mesi. Legato all'acqua salmastra e più raramente all'acqua dolce e ai campi allagati dell'entroterra. Corpo piuttosto compatto con becco e zampe corti.

**Lunghezza:** 18-20 cm

**Apertura alare:** 48-57 cm



♂ adulto in abito  
riproduttivo



adulto in abito  
invernale

---

## Corriere piccolo

Il corriere piccolo è presente nel Veneto da marzo a settembre e vi nidifica. Frequenta ambienti con poca vegetazione vicino all'acqua dolce e più raramente salmastra. Corpo piuttosto compatto con becco e zampe corti.

**Lunghezza:** 14-15 cm

**Apertura alare:** 42-48 cm



♂ adulto in abito  
riproduttivo

adulto in abito  
invernale



---

## Fratino

Il fratino è presente nel Veneto tutto l'anno e anche vi nidifica. Frequenta ambienti con poca vegetazione vicino all'acqua salata o salmastra in aree costiere. Corpo piuttosto compatto con becco e zampe corti.

**Lunghezza:** 15-17 cm

**Apertura alare:** 42-45 cm



♂ adulto



♀ adulta

---

## Piviere tortolino

Il piviere tortolino è presente nel Veneto soprattutto tra fine agosto e i primi di ottobre e più raramente in aprile. Preferisce gli ambienti aperti con bassa e rada vegetazione come pianori in montagna e campi coltivati in pianura. Corpo piuttosto compatto con becco e zampe corti.

**Lunghezza:** 23-26 cm

**Apertura alare:** 60-72 cm

♀ adulta



giovane



---

## Chiurlo piccolo

Il chiurlo piccolo è essenzialmente migratore nel Veneto (marzo-maggio; luglio-settembre). Preferisce gli ambienti legati all'acqua, anche salmastra, e anche i campi arati o con bassa vegetazione. Di forme piuttosto compatte, zampe e becco, arcuato verso il basso, lunghi.

**Lunghezza:** 40-42 cm

**Apertura alare:** 76-89 cm



adulto

---

## Chiurlo maggiore

Il chiurlo maggiore è presente nel Veneto tutto l'anno con minori presenze in maggio-giugno. Preferisce gli ambienti legati all'acqua, anche salmastra, e anche i campi arati o con bassa vegetazione. Di forme piuttosto compatte ma con collo allungato, zampe lunghe e becco, arcuato verso il basso, molto lungo.

**Lunghezza:** 50-60 cm

**Apertura alare:** 80-100 cm



adulto

---

## Pittima minore

La pittima minore, seppur non comune, è presente nel Veneto durante le migrazioni e i mesi invernali. Preferisce gli ambienti legati all'acqua salmastra, e le coste. Di forme piuttosto slanciate con zampe e becco, piegato leggermente verso l'alto, lunghi.

**Lunghezza:** 37-39 cm

**Apertura alare:** 70-80 cm



adulto in abito  
invernale

---

## Pittima reale

La pittima reale, è un po' più frequente dalla consimile pittima minore, ed è presente nel Veneto durante le migrazioni e nel periodo estivo con rare presenze invernali. Preferisce gli ambienti legati all'acqua dolce anche nell'entroterra. Di forme piuttosto slanciate con zampe lunghe e becco diritto e lungo.

**Lunghezza:** 40-44 cm

**Apertura alare:** 70-82 cm



adulto in abito  
di transizione

---

## Voltapietre

Il voltapietre è presente nel Veneto tutto l'anno con minori frequenza tra giugno e luglio. Preferisce gli ambienti legati all'acqua salmastra e costieri (più raro nell'entroterra). Di forme compatte con becco corto e appiattito in punta e zampe corte.

**Lunghezza:** 22-24 cm

**Apertura alare:** 50-57 cm

foto F. Piccolo



adulto in abito  
riproduttivo



abito invernale

---

## Piovanello maggiore

Il piovanello maggiore è regolare, seppur non comune, nel Veneto con maggiori presenze durante l'inverno e le migrazioni. Preferisce gli ambienti legati all'acqua salmastra, e le aree costiere. Di forme compatte con zampe corte e becco di media lunghezza e robusto.

**Lunghezza:** 23-25 cm

**Apertura alare:** 57-61 cm

adulto in abito  
invernale



foto F. Piccolo

---

## Combattente

Il combattente è presente nel Veneto durante le migrazioni e molto più raramente nei mesi invernali. Di forme piuttosto compatte, gambe e becco di lunghezza media. Preferisce le zone umide di vario tipo e anche campi e prati aperti specie se con pozzanghere e acquitrini.

**Lunghezza:** 20-30 cm

**Apertura alare:** 48-58 cm



adulto ♂ in abito  
riproduttivo



adulto in abito  
invernale

---

## Gambecchio frullino

Il gambecchio frullino è molto raro nel Veneto e vi compare preferibilmente in maggio, luglio e meno frequentemente gli altri mesi tardo estivi - autunnali. Di forme piuttosto compatte, zampe corte e becco di lunghezza media. Preferisce le acque salmastre e costiere.

**Lunghezza:** 15-18 cm

**Apertura alare:** 35-40 cm



foto S. Hueting

adulto

---

## Piovanello comune

Il piovanello comune è presente nel Veneto durante le migrazioni. Di forme poco slanciate con becco lungo e curvo verso il basso e zampe non lunghe. Preferisce gli ambienti legati all'acqua dolce e/o salmastra.

**Lunghezza:** 18-19 cm

**Apertura alare:** 42-46 cm



adulto in abito  
di transizione



giovane

---

## Gambecchio nano

Il gambecchio nano è presente nel Veneto durante le migrazioni (aprile-maggio e fine luglio-settembre). Di forme piuttosto compatte con becco e zampe corte (quest'ultime giallo-verdi). Preferisce gli ambienti legati all'acqua dolce e salmastra.

**Lunghezza:** 13-15 cm

**Apertura alare:** 34-37 cm

adulto



---

## Piovanello tridattilo

Il piovanello tridattilo è presente quasi tutto l'anno nel Veneto, con l'eccezione di giugno e minori presenze in luglio e agosto. Di forme piuttosto compatte con becco e zampe di lunghezza media. Preferisce gli ambienti legati all'acqua salmastra e costieri, specialmente i litorali; molto più raro nell'entroterra in acque dolci.

**Lunghezza:** 20-21 cm

**Apertura alare:** 40-45 cm



adulto in abito  
invernale

giovane



---

## Piovanello pancianera

Il piovanello pancianera è presente nel Veneto praticamente tutto l'anno, ma molto raramente in giugno. Preferisce gli ambienti legati all'acqua salmastra e anche litoranei, molto più raro nell'entroterra. Ha forme piuttosto compatte con becco abbastanza lungo e ricurvo verso il basso; zampe piuttosto corte.

**Lunghezza:** 16-20 cm

**Apertura alare:** 38-43 cm



adulto in abito  
riproduttivo

adulto in abito  
invernale



---

## Piovanello violetto

Il piovanello violetto è molto raro e compare nel Veneto nei mesi più freddi, da fine ottobre e vi rimane fino ai primi di marzo. Preferisce gli ambienti litoranei e salmastri. Di forme compatte con becco nella media e zampe piuttosto corte.

**Lunghezza:** 20-22 cm

**Apertura alare:** 42-46 cm



adulto in abito  
invernale



adulto in abito  
riproduttivo

---

## Gambecchio comune

Il gambecchio comune è presente nel Veneto quasi tutto l'anno ad esclusione del periodo metà giugno-metà luglio (meno frequente in inverno). Di forme piuttosto compatte con becco e zampe corte (quest'ultime nerastre). Preferisce gli ambienti legati all'acqua dolce e salmastra. E' tra i più piccoli limicoli europei.

**Lunghezza:** 12-14 cm

**Apertura alare:** 34-37 cm



adulto in abito  
riproduttivo

adulto



---

## Beccaccia

La beccaccia, specie molto elusiva, è regolare, seppur non comune, nel Veneto con maggiori presenze durante l'inverno e le migrazioni. Preferisce gli ambienti boschivi, siepi, anche parchi con suolo morbido. Di forme compatte, zampe corte e becco lungo e dritto.

**Lunghezza:** 33-35 cm

**Apertura alare:** 56-60 cm



foto F. Piccolo

---

## Frullino

Il frullino, specie molto elusiva, è presente da novembre ad aprile e più raramente anche in agosto-ottobre. Preferisce gli ambienti legati all'acqua dolce o salmastra con vegetazione bassa. Di forme compatte, zampe corte e becco discretamente lungo.

**Lunghezza:** 17-19 cm

**Apertura alare:** 38-42 cm



adulto

---

## Beccaccino

Il beccaccino è presente in Veneto dalla fine di luglio ai primi di maggio passandovi quindi anche l'inverno. Ha forme compatte con becco molto lungo e dritto e zampe di lunghezza media. Preferisce soprattutto gli ambienti legati all'acqua dolce o salmastra e anche prati allagati.

**Lunghezza:** 25-27 cm

**Apertura alare:** 44-47 cm



adulto

---

## Falaropo beccosottile

Il falaropo beccosottile è molto raro nel Veneto e vi compare tra fine agosto e settembre e ai primi di giugno. Frequenta preferibilmente ambienti legati all'acqua dolce. Ha forme compatte con becco molto sottile e di media lunghezza.

**Lunghezza:** 18-19 cm

**Apertura alare:** 32-41 cm

foto M. & J. Sighele

♀ adulta in abito  
riproduttivo



foto Archivio EBNITALIA



adulto in abito  
invernale


---

## Piro piro piccolo

Il piro piro piccolo è presente nel Veneto tutto l'anno e anche vi nidifica. Di forme piuttosto compatte ha becco mediamente lungo e zampe piuttosto corte. Si osserva in ambienti con presenza di acque di vario tipo e nei pressi anche in manufatti; è una specie discretamente "urbana".

**Lunghezza:** 19-21 cm

**Apertura alare:** 38-41 cm



adulto

---

## Piro piro culbianco

Il piro piro culbianco nel Veneto è presente quasi tutto l'anno con ridotte presenze solo in maggio. Di forme un po' slanciate ha becco e zampe lunghi nella media. E' legato all'acqua dolce e salmastra, spesso frequentando canali e fossati.

**Lunghezza:** 21-24 cm

**Apertura alare:** 57-61 cm



adulto

---

## Pettegola

La pettegola è presente nel Veneto tutto l'anno e anche vi nidifica. Di forme un po' slanciate con becco e zampe discretamente lunghi. Frequenta prevalentemente acque salmastre lagunari e più di rado acque dolci nell'entroterra.

**Lunghezza:** 27-29 cm

**Apertura alare:** 59-66 cm



adulto in abito  
riproduttivo


---

## Albastrello

L'albastrello è una specie abbastanza rara nel Veneto dove è presente soprattutto durante le migrazioni (marzo-aprile e fine giugno-settembre) mentre le osservazioni invernali sono ancora più rare. Ha forme slanciate e con becco sottile e zampe entrambi lunghi. Preferisce gli ambienti legati all'acqua dolce o salmastra.

**Lunghezza:** 22-24 cm

**Apertura alare:** 55-59 cm



adulto

---

## Piro piro boschereccio

Il piro piro boschereccio è essenzialmente migratore nel Veneto (marzo-maggio e luglio-settembre). Corpo piuttosto slanciato con becco e zampe nelle media. Frequenta di norma ambienti con acqua dolce e salmastra anche nell'entroterra.

**Lunghezza:** 19-21 cm

**Apertura alare:** 56-57 cm



adulto

---

## Totano moro

Il totano moro è presente nel Veneto praticamente tutto l'anno ma non vi nidifica. Corpo piuttosto slanciato con zampe e becco lungo e sottile. Frequenta gli ambienti costieri con acque salmastre e dolci, e anche nell'entroterra.

**Lunghezza:** 29-31 cm

**Apertura alare:** 61-67 cm



adulto in abito  
invernale



adulto in abito  
di transizione

---

## Pantana

La pantana nel Veneto è presente tutto l'anno ma più raramente attorno a fine maggio-giugno. Frequenta le zone umide d'acqua dolce o salmastra anche nell'entroterra. Corpo piuttosto slanciato con un robusto lungo becco leggermente arcuato verso l'alto e zampe lunghe.

**Lunghezza:** 30-33 cm

**Apertura alare:** 68-70 cm



adulto

---

## Pernice di mare

La pernice di mare è presente nel Veneto da aprile a settembre e vi nidifica seppur con poche coppie. Di forme piuttosto normali con collo, becco e zampe molto corti. Preferisce gli ambienti costieri legati all'acqua dolce o salmastra.

**Lunghezza:** 25 cm

**Apertura alare:** 60-65 cm

adulto



---


## Limicoli in volo



occhione



beccaccia  
di mare



cavaliere  
d'Italia



avocetta



piviere dorato



pavoncella

---

## Limicoli in volo



pivieressa



corriere grosso



corriere piccolo



fratino



piviere tortolino

---

## Limicoli in volo



chiurlo piccolo



chiurlo maggiore

foto M. Cargasacchi



pittima minore



pittima reale



voltapietre



piovanello  
maggiore

---

## Limicoli in volo



combattente



piovanello  
comune



gambecchio  
nano



gambecchio  
comune



piovanello  
tridattilo



piovanello  
pancianera

## Limicoli in volo



beccaccia



frullino

foto M. Cargasacchi



beccaccino

piro piro piccolo



piro piro  
boschereccio



piro piro culbianco



---

## Limicoli in volo



pettegola



totano moro in  
abito riproduttivo



pantana



pernice di  
mare



albastrello

## Becchi vari a confronto





Ulteriori informazioni sugli  
uccelli del Veneto:  
[www.birdingveneto.eu](http://www.birdingveneto.eu)

**Venezia Birdwatching**  
[www.veneziabirdwatching.eu](http://www.veneziabirdwatching.eu)

