

Emanuele Stival

Guida agli uccelli del Veneto - 1

Anseriformi, Fenicotteriformi, Podicipediformi, Gruiformi,
Gaviformi, Procellariiformi, Ciconiformi, Suliformi e
Pelecaniformi



Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Foto e testi di Emanuele Stival se non diversamente riportato

Un ringraziamento particolare va a coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa pubblicazione con le loro foto messe a disposizione: Ryan Askren, Andrea Barbon, Matteo Cargasacchi, Fabrizio Cimino, Gianni Conca, Roberto D’Alterio, Francesco Saverio La Notte, Alessio Quaglierini, Paolo Scrimatore, Franco Zanatta. Un ringraziamento particolare va a Tomaso Bisol, Alessandro Paiusco e Francesca Stival che hanno contribuito alla revisione dei testi e con utili suggerimenti.

© Copyright 2025 • Venezia Birdwatching – info@veneziabirdwatching.eu

E. Stival, 2025. Guida agli uccelli del Veneto – 1 - Anseriformi, Fenicotteriformi, Podicipediformi, Gruiformi, Gaviformi, Procellariiformi, Ciconiformi, Suliformi e Pelecaniformi. Venezia Birdwatching – Venezia.

Con il contributo di



Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Come usare la guida

Dimensioni

Le dimensioni delle varie specie sono confrontate con alcune specie molto conosciute come passera d’Italia, merlo, piccione di città e cornacchia:



Esempio per il colombaccio (dimensioni intermedie tra piccione di città e cornacchia):




Frequenza

A fianco del nome di ogni specie sono riportate delle barre che danno una immediata idea della loro frequenza.




Distribuzione e presenza

Come nell’esempio riportato del colombaccio, per ogni specie è riportata la cartina di distribuzione nel Veneto colorata così:



e completata da una breve nota dal calendario (fenologia) annuale:



La cartina di distribuzione e la fenologia sono tratte e adattate da Stival & Sighele 2019, mentre l’ordinamento sistematico segue Avilist checklist 2025.

***Gobbi* pp. 6-7**



ANSERIFORMI

***Cigni* pp. 8-11**



***Oche* pp. 12-20**



***Anatre* pp. 21-46**



FENICOTTERIFORMI

***Fenicotteri* pp. 47-48**



PODICIPEDIFORMI

***Svassi* pp. 49-53**



GRUIFORMI
***Gru e Rallidi* p. 54-61**



GAVIFORMI
***Strolaghe* pp. 62-65**



PROCELLARIFORMI
***Berte* pp. 66-68**



CICONIFORMI

Cicogne pp. 69-70



SULIFORMI

Sule p. 71



Cormorani pp. 72-74



*Ibis e spatole
pp. 75-77*



PELECANIFORMI

Pellicani pp. 78-79



Tarabusi pp. 80-81



Garzette pp. 82-83



*Nitticore e sgarze
pp. 84-85*



Aironi pp. 86-89



Gobbo rugginoso



Oxyura leucocephala - White-headed Duck

Anatra tuffatrice piuttosto compatta di medio–piccole dimensioni e rarissima in Veneto. Molto utile per distinguere la specie dal consimile gobbo della Giamaica è la presenza di un rigonfiamento nella parte superiore del becco.



*piumaggio marrone
e bianco/nero sul
capo (maschio)*

Maschio in
abito

*becco
azzurro con
"gobba"*

Foto F. Cimino



*lunga e
affusolata coda
che talvolta viene
tenuta sollevata*



Femmina

Foto F. Cimino



Osservato accidentalmente nel delta del Po in acque poco profonde.




Gobbo della Giamaica



Oxyura jamaicensis - Ruddy Duck

Anatra tuffatrice di piccole dimensioni. Specie introdotta dall'uomo in Gran Bretagna, da dove si è diffusa in varie parti d'Europa. Somiglia molto al gobbo rugginoso con il quale può ibridarsi, creando problemi alla sua conservazione.



Osservato molto raramente in alcune zone umide poco profonde ed eutrofiche. Le osservazioni sono state costiere e in alcune zone umide dell'entroterra.



Cigno reale




Cygnus olor - Mute Swan

È il più grande e comune dei cigni osservabili in Veneto. Ha un comportamento maestoso e tipico è il suo “fischio” che deriva dal fruscio dell’aria tra le remiganti delle ali quando è in volo. Spesso si incontrano individui confidenti che si aspettano il cibo da noi umani.



Adulto



Distribuito in buona parte del Veneto, soprattutto lungo la costa. Frequenta aree lagunari, laghi e stagni anche di piccole dimensioni.





Cigno nero



Cygnus atratus - Black Swan

Cigno di dimensioni lievemente inferiori al cigno reale, le sue presenze in Veneto sono da ricondurre a soggetti introdotti o fuggiti dalla cattività. Spesso si associa ai consimili cigni reali dai quali è facilissimo distinguerli per via del piumaggio.



Distribuito in pianura soprattutto nelle grandi valli lagunari, in laguna aperta e alla foce di fiumi e canali. Presente anche in parchi con ampi stagni con individui di origine domestica. Presente tutto l'anno.


Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Cigno minore



Cygnus columbianus - Tundra Swan

Il più piccolo dei cigni europei, compare molto raramente nel Veneto. Si alimenta aggregandosi talvolta ai cigni reali. Come gli altri cigni ha un volo potente e teso, ma il battito delle ali non è rumoroso come quello del cigno reale. Il suo verso è del tutto caratteristico.



Giunge raramente nel Veneto con pochi individui nei mesi invernali. Frequenta campi con stoppie, prati e campi con scarsa o bassa vegetazione, stagni e valli da pesca.




Cigno selvatico



Cygnus cygnus - Whooper Swan

Grande cigno molto raro in Italia e nel Veneto. Si può confondere con il cigno minore, ma le sue dimensioni sono maggiori e il disegno del giallo sul becco è diverso. Dal cigno reale si distingue più facilmente perché quest'ultimo ha invece il becco rosso-arancione e nero.



Rarissimo nel Veneto. Si osserva sia in grandi stagni o valli da pesca sia su prati e campi, dove si alimenta e riposa. Nidifica nell'Europa nord orientale.


Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Oca colombaccio



Branta bernicla - Brant Goose


Oca di dimensioni medie nel nord Europa forma grossi gruppi, mentre nel Veneto è estremamente rara dove giunge con individui singoli, ancora più raramente piccoli gruppi, e si aggrega alle altre oche.



*piumaggio molto scuro
soprattutto nelle parti
superiori, addome grigio
scuro e sottocoda bianco*

← *capo e collo neri con strie
bianche sotto il capo*

*i giovani e in parte gli
immaturi hanno sottili
barre bianche sulle ali e
mancano delle macchie
bianche sotto il capo*



Rarissima nel Veneto dove giunge nei mesi invernali. Frequenta soprattutto campi con prati o stoppie dove cerca il cibo


Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Oca collarosso




Branta ruficollis - Red-breasted Goose

Oca piuttosto piccola e molto colorata, becco molto piccolo e nero. In Veneto si osserva solo di inverno con uno o pochi individui. In genere si aggrega ad altre oche, come le lombardelle e le selvatiche, arrivando con i migratori nel tardo autunno.



Specie molto rara in Veneto, frequenta campi con stoppie, prati e campi seminati a frumento.



Oca del Canada



Branta canadensis - Canada Goose

Oca di dimensioni molto grandi, più dell'oca selvatica. In libertà si trovano individui introdotti per scopi ornamentali e fuggiti, o loro discendenti. Talvolta si può accoppiare con altre oche formando degli ibridi. In genere presente con pochi individui e associata con altre oche svernanti.



capo e collo neri con
ampia banda bianca
che dalle orecchie
attraversa la gola


piumaggio
marrone su
schiena e
fianchi



ibrido di oca del
Canada con oca
selvatica



becco nero



Presente in varie zone di alta o bassa pianura del Veneto.
Frequenta valli da pesca, stagni e campi di stoppie e prati con
bassa vegetazione.



Oca facciabianca



Branta leucopsis - Barnacle Goose

Oca abbastanza piccola, che si associa spesso alle altre oche che arrivano in inverno. Alcuni individui presenti in Veneto sono esemplari fuggiti dalla cattività.




*piumaggio
superiormente nero e
grigio; inferiormente
con ampie zone
bianche e grigie*

*capo prevalentemente
bianco anche sulla
fronte e piccolo becco
nero*



Presente in varie zone di bassa pianura del Veneto. Frequenta valli da pesca, stagni, campi di stoppie e prati con bassa vegetazione.



Oca delle nevi



Anser caerulescens - Snow Goose

Oca che nidifica nelle aree più settentrionali d'Europa giunge da noi accidentalmente con soggetti svernanti, talvolta di possibile origine aufuga. Può avere colorazione quasi completamente bianca o essere molto scura con capo bianco.



parte terminale
delle ali nera

Foto R. D'Alterio


Adulto



piumaggi molto
variabili



Poche le segnalazioni nel Veneto tutte in zone prossime alla costa.





Oca selvatica



Anser anser - Greylag Goose

Grande oca, la più comune nel Veneto dove ormai nidifica da tempo. In inverno giungono anche contingenti dal nord Europa e si aggiungono alla popolazione sedentaria. Durante l'inverno pascola spesso associata alle altre oche. Ha un richiamo caratteristico utile al suo riconoscimento.



Distribuita soprattutto lungo le zone costiere ma anche in alcune aree pianeggianti dell'entroterra. Frequenta campi di stoppie e prati per l'alimentazione. Nidifica presso zone umide.




Oca lombardella minore



Anser erythropus - Lesser White-fronted Goose

Oca molto somigliante all'oca lombardella, dalla quale si distingue per piccoli particolari: occhio circondato da giallo negli adulti e becco più piccolo. Quando presente, si associa alle altre oche svernanti in Veneto. Molto rara, arriva irregolarmente con uno o al più pochi individui.



*piumaggio marrone con
barre nere sull'addome
e sottocoda bianco*

*anello attorno
all'occhio giallo e
becco piccolo rosa*

Adulto

Immaturato

*dettaglio del capo con
pochissimo bianco e
poco giallo attorno
all'occhio*




Presente non tutti gli anni nelle aree costiere, soprattutto nella zona di Caorle con pochi individui. Frequenta i campi di stoppie o prati e seminativi a frumento.






Oca di medie dimensioni, la più numerosa e facile da vedere in inverno. Compie grandi spostamenti alla ricerca del cibo cambiando spesso le aree di foraggiamento. Ha un verso caratteristico che permette di distinguerla dall'oca selvatica.



Distribuita soprattutto in inverno lungo le aree costiere del Veneto, con maggiori concentrazioni verso est. Frequenta i campi di stoppie, prati o campi seminati a frumento.




Oca granaiola della tundra



Anser serrirostris - Tundra Bean Goose

Oca di dimensioni simili all'oca lombardella che giunge da noi in inverno, spesso associandosi alle altre oche. Fino agli anni '90 del secolo scorso la specie era di presenza numerosa e regolare, ora si è fatta rarissima con pochi individui svernanti.



Presente con pochi individui e raramente nelle aree costiere soprattutto nella zona di Caorle-Bibione. Frequenta i campi di stoppie o prati e seminativi a frumento.



Anatra mandarina





Aix galericulata - Mandarin Duck


Anatra che si osserva con individui rinselvatichiti fuggiti dalla cattività anche provenienti da altri Paesi europei. Il maschio ha un piumaggio bellissimo e inconfondibile. Spesso si aggrega ad altri anatidi come ad esempio ai germani reali.



piumaggio inconfondibile nel maschio, molto colorato; la femmina è prevalentemente marrone-grigiastro



Osservata in Veneto in varie località ben distribuite in maniera omogenea. Si osserva lungo fossati, stagni e altre zone umide.



Oca egiziana



Alopochen aegyptiaca - Egyptian Goose

Anseriforme grande circa come l'oca lombardella. Si vede talvolta vicina a casarche con le quali talvolta può formare ibridi. Si osserva di norma con pochi individui, al massimo una decina. Sessi simili.



piumaggio prevalentemente marrone e oca

becco rosa con apice nero e occhio bordato di marrone scuro


sottocoda fulvo-ocra




ali con ampia area bianca



ibrido di oca egiziana con casarca





Distribuita in varie località di pianura del Veneto. Frequenta specchi d'acqua e campi di stoppie o seminati da poco a frumento.






Tadorna tadorna - Common Shelduck

Anatide di grandi dimensioni, intermedia tra un germano reale e un'oca. Talvolta costruisce il nido nelle tani delle volpi, ma anche in modo tradizionale a terra. Gli adulti non si immergono, ma i piccoli in caso di pericolo possono farlo. Molto appariscente, in autunno-inverno sceglie pochi siti idonei dove si raggruppa in grossi stormi.



Legato a zone d'acqua dolce o salmastra è presente maggiormente lungo i litorali e le lagune venete. Talvolta nidifica anche vicino a canali e fossati.





Tadorna ferruginea - Ruddy Shelduck

Anatide che, come la volpoca, ha caratteristiche intermedie tra un'anatra e un'oca. Si aggrega spesso con le volpocche dalle quali si distingue facilmente per la colorazione del piumaggio. Anche il verso, piuttosto roco, è molto diverso da quello della volpoca.



*becco nero e
collarino nero
nel maschio*

*piumaggio di base
fulvo-ocra, intenso
inferiormente*


Maschio



*ali con estremità
nere e grande area
chiara anteriore*



Femmina



Distribuita lungo le aree costiere del Veneto e anche in alcune zone interne. Frequenta soprattutto lagune, valli da pesca e anche laghi e grandi stagni.





Moretta codona




Clangula hyemalis - Long-tailed Duck

Anatra tuffatrice di medie dimensioni con maschio che esibisce una lunga e appuntita coda. Il maschio in inverno ha una colorazione bianco/nera con coda lunghissima inconfondibile. Rara in Veneto nei mesi invernali con presenze di pochi individui. Di abitudini gregarie.



Presente durante le migrazioni e in inverno soprattutto in lagune, sul mare e anche nel lago di Garda. Frequenta acque di discreta profondità.



Edredone



Somateria mollissima - Common Eider

Grande anatra tuffatrice di abitudini marine, più raramente presente in acque dolci. Si immerge a caccia di cozze e molluschi; ha abitudini gregarie soprattutto in inverno. Il maschio ha una colorazione vistosa mentre la femmina ce l'ha prevalentemente marrone. Ha un profilo del capo caratteristico e allineato con la parte superiore del becco.



**Maschio in
abito**



Femmina

*piumaggio bianco e
nero nel maschio e
marrone nella
femmina*

*punta
chiara*

becco allineato con la fronte




**Maschio in
abito**



**Maschio in
eclisse**



Rarissimo in Veneto, è stato osservato in acque marine, lungo le coste e anche in laguna aperta di Venezia, soprattutto in inverno.



Orchetto marino




Melanitta nigra - Common Scoter


Anatra tuffatrice di medio-grandi dimensioni, molto somigliante all'orco marino; la differenza più evidente con questa specie è l'assenza di bianco sulle ali. Di abitudini gregarie soprattutto in inverno.



piumaggio nero (maschio) o marrone scuro (femmina)



Presente seppur raramente nei mesi invernali soprattutto nelle acque marine costiere e anche sui grandi laghi (Garda).



Orco marino



Melanitta fusca - Velvet Scoter

Anatra tuffatrice di grandi dimensioni che si nutre immergendosi e cercando molluschi, crostacei e altri animali marini. Ha un volo teso e potente. Giunge in Veneto abbastanza regolarmente ma con numeri abbastanza ridotti. Di abitudini gregarie. Banda bianca sull'ala in entrambi i sessi e a tutte le età.

Maschio immaturo



Foto A. Quaglierini

becco giallo alla base e nero verso l'estremità (arrotondato in basso verso la base)

piumaggio prevalentemente nerastro



Giovane

ampia banda bianca

Foto P. Scrimatore


disegno del capo variabile

Giovani



barra alare bianca non sempre visibile

Foto A. Quaglierini



Non comune. Osservato in Veneto soprattutto lungo le coste, lagune aperte e sul lago di Garda. Scende da noi nei mesi invernali.




Quattrocchi



Bucephala clangula - Common Goldeneye


Anatra tuffatrice di medie dimensioni dalle forme compatte e arrotondate. Piuttosto raro in Veneto, ha un piumaggio inconfondibile. Il maschio in abito eclissale somiglia molto alla femmina, con in più una stria chiara tra becco e occhio.



capo verde e
occhio giallo

becco nero e
macchia bianca
arrotondata tra
occhi e becco

Maschio in abito




ampie chiazze
bianche


capo marrone
e occhio giallo



Femmina



Presente in Veneto nei mesi invernali sui laghi ma talvolta anche in piccoli stagni e lungo le coste.





Pesciaiola



Mergellus albellus - Smew

Piccola anatra tuffatrice il cui maschio ha un caratteristico piumaggio bianco e nero. Imparentata strettamente con gli smerghi, generalmente si osserva in Veneto con singoli o pochissimi individui negli inverni molto rigidi nel centro-nord Europa.



Presente raramente nel Veneto in zone umide di acqua dolce e lagune.



Smergo minore



Mergus serrator - Red-breasted Merganser

Anatra tuffatrice molto simile allo smergo maggiore, ma più piccola. Di abitudini ecologiche diverse, legate soprattutto alle lagune, e presente in Veneto nei mesi invernali con individui isolati o piccoli gruppi.

**Maschio in
abito**

*ciuffo spesso
arruffato*

*petto
marrone*

*banda alare
bianca*

Maschio in eclissi


*ampia
banda alare
bianca*

Femmina

*bordo
sfumato*



Presente in Veneto soprattutto nella laguna aperta di Venezia e nel delta del Po, in mare e in minor misura sul lago di Garda. Arriva nei mesi freddi e riparte in primavera.





Smergo maggiore



Mergus merganser - Common Merganser

Grande anatra tuffatrice che ormai da vari anni si riproduce regolarmente anche in Veneto. Ha un becco allungato e con falsi “denti” utili a trattenere i pesci dei quali si nutre. Ha un volo teso e con il capo abbassato. Di abitudini abbastanza gregarie.



Presente in varie aree del Veneto soprattutto a quote collinari e in minor misura montane. Giunge raramente in pianura ad eccezione del lago di Garda. Frequenta grandi laghi e fiumi.

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Fistione turco



Netta rufina - Red-crested Pochard

Anatide simile come forma e abitudini alle anatre di superficie, dalle quali tuttavia si differenzia perché spesso si immerge per alimentarsi. I colori del maschio sono caratteristici e appariscenti. In alcune località (ad esempio: Lago di Garda) si dimostra particolarmente confidente nei confronti dell'uomo.




Maschio in abito




Maschio in eclissi



Femmina



Presente in Veneto in diverse zone umide di acqua dolce con canneti (Lago di Garda, stagni costieri), anche come nidificante.





Moretta tabaccata



Aythya nyroca - Ferruginous Duck

Anatra tuffatrice di medio-piccole dimensioni, abbastanza rara in Veneto. Ha abitudini "riservate" nascondendosi tra la vegetazione nelle zone umide di acqua dolce. Specie poco gregaria. Maschio e femmina sono simili.



Distribuita in Veneto in varie zone umide di acqua dolce con presenza di canneti e altra vegetazione palustre, soprattutto nelle aree costiere dove sverna e talvolta nidifica.





Moriglione




Aythya ferina - Common Pochard

Anatra tuffatrice abbastanza grande, si immerge nell'acqua per procurarsi il cibo. Per involarsi si aiuta con una breve rincorsa. Ha un volo piuttosto teso e lineare. La coda è abbastanza corta e si abbassa quando nuota.



Distribuito in molte aree del Veneto, dove nidifica nelle zone costiere in numeri ridotti. Frequenta zone umide con acqua di discreta profondità nella quale possa immergersi.



Moretta dal collare



Aythya collaris - Ring-necked Duck

Anatra tuffatrice del tutto accidentale in Veneto. Assomiglia in modo notevole alla comune moretta, con il maschio che ha differenze più evidenti.




Foto F. Cimino



Osservata in una sola occasione in Veneto in sosta al lago del Frassinò – VR.





Moretta



Aythya fuligula - Tufted Duck

Anatra tuffatrice di medie dimensioni abbastanza diffusa, anche nelle aree di alta pianura e collinari, e ben riconoscibile soprattutto nel maschio con un bel ciuffo sulla nuca. È di abitudini spiccatamente gregarie.



Distribuito in varie zone umide del Veneto dove anche nidifica sia in ambiti costieri che collinari o di alta pianura. Frequenta laghi soprattutto e altre zone umide con acque abbastanza profonde, anche lagune e grandi stagni.



Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Moretta grigia



Aythya marila - Greater Scaup

Anatra tuffatrice non comune in Veneto. Assomiglia alla moretta, dalla quale si distingue, nel maschio, per il dorso grigio e l'assenza di ciuffo sulla nuca. Di abitudini gregarie di solito si osserva con pochi individui da noi, ma spesso si associa alle comuni morette.



Presente in Veneto, in genere con pochi individui nei mesi invernali, negli stagni d'acqua dolce abbastanza profondi e nei laghi della pianura Veneta.





Marzaiola




Spatula querquedula - Garganey

Piccola anatra di superficie di dimensioni appena superiori all'alzavola. Ha un verso caratteristico simile a "crek" da cui il nome dialettale di crècola. Si ciba in acque di bassa profondità senza immergersi. Ha un volo piuttosto teso e decollo verticale come le altre anatre di superficie.



Distribuita soprattutto durante la migrazione in molte zone umide, anche piccole e soprattutto di acqua dolce, del Veneto. Non molto comune come nidificante.



Marzaiola americana



Spatula discors - Blue-winged Teal

Di dimensioni identiche alla marzaiola è accidentale in Veneto come in tutta l'Italia. La femmina è molto simile e difficilmente distinguibile dalla femmina della marzaiola.



Foto M. Cargasacchi

Maschio



Femmina



Accidentale in Veneto dove è stata rilevato in una sola occasione in un'area lagunare.





Mestolone




Spatula clypeata - Northern Shoveler

Anatra caratterizzata da un becco grande e allargato, simile a un mestolo. Si nutre sondando il fondo di acque basse senza immergersi. Come le altre anatre di superficie decolla senza rincorsa ed esibisce un volo piuttosto veloce e dritto con continui battiti.





Diffuso durante le migrazioni in varie località soprattutto di pianura. Nidifica e sverna soprattutto in zone umide costiere anche salmastre.






Mareca strepera - Gadwall

Anatra simile per dimensioni al germano reale. La femmina è molto simile alla femmina del germano reale e si distingue da quest'ultima grazie ad un evidente specchio alare bianco. Il maschio è di colore marrone – grigio e poco evidente. Anatra di superficie che si stacca in volo senza bisogno di rincorsa.



Distribuita soprattutto lungo la costa dove saltuariamente nidifica in zone umide d'acqua dolce o salmastra. Meno frequente nell'entroterra dove si può incontrare soprattutto alle basse quote.





Fischione




Mareca penelope - Eurasian Wigeon

Anatra di superficie di medie dimensioni dal tipico richiamo simile ad un fischio. È legato alle acque alle acque poco profonde per la ricerca del cibo e non è per niente elusivo. Durante l'inverno è strettamente gregario e si osserva anche in gruppi molto numerosi. Femmina molto mimetica.



Presente soprattutto in ambiti acquatici lungo la costa e in misura minore nelle zone umide dell'interno. Frequenta anche acque marine per la sosta.




Germano reale




Anas platyrhynchos - Mallard

Il più comune e diffuso tra gli anatidi del Veneto. Ha un richiamo caratteristico del tipo “meek” nel maschio e un “quek” ripetuto nella femmina. Si invola senza rincorsa e non si immerge per cercare il cibo. Volo diritto. In inverno presente anche in gruppi piuttosto numerosi.




Maschio in abito



Maschio in eclissi



Femmina





Presente in tutto il Veneto, dove nidifica quasi ovunque evitando solo le aree con poche zone umide con acque poco profonde. In periodo riproduttivo si sparge anche in habitat di campagna o con incolti purché con canali o fossati nelle vicinanze.


Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Anas acuta - Northern Pintail

Anatra di superficie di superficie con il collo discretamente lungo e la coda lunga e appuntita. In inverno risulta non facile da osservare in quanto frequenta quasi esclusivamente le valli da pesca (di non facile accessibilità). Come gli altri anatidi ha abitudini gregarie.



Nel Veneto è presente soprattutto nelle zone umide dolci e salmastre delle basse quote. Non molto diffuso, ma presente in grandi numeri in inverno in alcune valli da pesca della laguna di Venezia.





Alzavola




Anas crecca - Green-winged Teal

L'anatra di superficie più piccola presente in Europa; come ricorda il nome "alza" "vola" ha un involo quasi verticale e veloce. È molto adattabile ecologicamente e molto diffusa soprattutto in inverno. Ha un richiamo particolare e ben riconoscibile: un "triil" che aiuta ad individuarla.



Distribuita nelle aree pianeggianti o alle basse quote in tutto il Veneto, con notevoli concentrazioni nelle aree lagunari. Spesso si sente quando sta nascosta nell'acqua attornata da alberi e cespugli.




Fenicottero minore



Phoeniconaias minor - Lesser Flamingo

Piccolo fenicottero del tutto accidentale in Veneto simile al fenicottero ma con dimensioni nettamente inferiori. Ha aspetto e abitudini simili al fenicottero. Si nutre filtrando l'acqua con il becco.



Del tutto accidentale in Veneto, è stato osservato in aree costiere lagunari con acqua salmastra o dolce poco profonda.



Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Fenicottero




Phoenicopterus roseus - Greater Flamingo

Unico appartenente al gruppo dei fenicotteri osservabile in Europa, è ormai presente stabilmente nel Veneto. Inconfondibile per le sue dimensioni, la silhouette e per la forma del becco. Ha abitudini strettamente gregarie in ogni stagione.



Distribuito nelle zone umide d'acqua dolce o salmastra costiere del Veneto. Presenze sporadiche in altre zone dell'entroterra, anche con individui singoli.





Tuffetto



Tachybaptus ruficollis - Little Grebe

Il più piccolo tra gli svassi è anche quello più diffuso in Veneto in tutte le stagioni. Ha aspetto arrotondato, con coda molto corta e visto da dietro sembra una palla di piume. Si immerge per catturare piccoli animali acquatici dei quali si nutre. Volo di norma breve e basso sull'acqua.



Specie presente in molte zone umide d'acqua dolce con vegetazione ripariale, poco profonde. Distribuito in molte zone del Veneto anche a quote montane.


Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Svasso cornuto



Podiceps auritus - Horned Grebe

Piccolo svasso, raro nel Veneto e osservabile in genere con individui isolati, raramente piccoli gruppi. In abito invernale, simile nell'aspetto allo svasso piccolo, al quale spesso si associa. Il volo è teso e di norma basso sull'acqua. Maschi e femmine indistinguibili in natura.



Presente durante i mesi invernali con pochi individui soprattutto nelle lagune e litorali costieri e anche nei grandi laghi veronesi.





Svasso collarosso




Podiceps grisegena - Red-necked Grebe

Svasso piuttosto grande, di dimensioni inferiori solo allo svasso maggiore. Come i suoi consimili ha zampe lobate e si immerge per cercare i pesci dei quali si nutre. In genere giunge in Veneto con singoli individui.



Presente in Veneto con pochi individui durante le migrazioni e i mesi più freddi, soprattutto sulla costa e sui laghi veronesi. Frequenta ambienti acquatici di ogni genere come stagni, canali, mare, lagune, con preferenza per quelli con vegetazione ripariale.





Svasso maggiore



Podiceps cristatus - Great Crested Grebe

Il più grande degli svassi europei. Ha un aspetto molto slanciato, con collo lungo, ben visibile sia in volo che posato. In genere i voli di spostamento diritti e rapidi avvengono vicini al pelo sull'acqua. In inverno spesso si aggrega in gruppi anche di qualche centinaio di individui.



Distribuito in varie zone umide del Veneto, non solo costiere, con sufficientemente profondità. In inverno anche in mare vicino alle coste.





Svasso piccolo



Podiceps nigricollis - Black-necked Grebe

Svasso di piccole dimensioni, poco più grande del tuffetto. Ha abitudini gregarie e come i suoi simili si immerge per cercare le sue prede e ha un volo veloce e teso basso sull'acqua. Simile allo svasso cornuto specialmente in abito invernale.




Distribuito, soprattutto nei mesi più freddi, sul mare, lagune e valli da pesca costiere e su fiumi e grandi laghi dell'entroterra.






Grus grus - Common Crane

Il più grande appartenente all'ordine dei gruiformi, è ben riconoscibile per le grandi dimensioni e la colorazione grigio-nera. In volo tiene il collo teso diversamente da quanto avviene negli aironi. Facile osservarla durante gli spostamenti quando in grossi stormi, spesso a "V", sorvola il territorio.



Presente durante le migrazioni in molte aree del Veneto, soprattutto pianeggianti, e in sosta su alcune aree aperte con stoppie o prati, talvolta in acquitrini. Meno numerosa in inverno.




Porciglione





Rallus aquaticus - Water Rail


Rallide di medio-piccole dimensioni, ha un corpo a sezione ovale che gli consente di intrufolarsi agevolmente tra la fitta vegetazione palustre e un becco lungo e curvo verso il basso. Molto mimetico ed elusivo, è molto più facile sentirlo cantare che vederlo.



piumaggio prevalentemente marrone e grigio con barrature bianche e nere sui fianchi



Presente come nidificante in molte zone umide di acqua dolce del Veneto. Durante lo svernamento aumenta la sua visibilità e diventa più facile incontrarlo; si alimenta anche pascolando su prati.



A bar chart with five bars of increasing height from left to right. The first two bars are red, and the last three are blue. The heights represent the number of people in each age group.


Age Group	Number of People
13-17	1
18-24	2
25-34	3
35-44	4
45-54	5



Piccolo rallide, somigliante più alle quaglie che ai rallidi veri e propri. Ha un canto molto potente e ripetitivo (un “crex crex”) che gli permette di marcare i territori nelle zone prative di montagna, fino a lunghe distanze. Durante le esibizioni canore di norma rimane completamente nascosto nella vegetazione.



Foto M. Cargasacchi



Presente in Veneto durante il periodo in aree montane con dolci declivi erbosi e di ampia superficie. Osservato raramente in altre zone, anche di pianura, durante le migrazioni.





Voltolino




Porzana porzana - Spotted Crane

Piccolo rallide di dimensioni intermedie tra schiribilla e gallinella d'acqua. Non facile da vedere e di abitudini elusive, si rifugia come la schiribilla tra la fitta vegetazione acquatica quando si sente osservato.



Presente nel Veneto soprattutto durante le migrazioni, molto raramente in inverno. Frequenta zone umide d'acqua dolce o salmastra che abbiano una discreta vegetazione palustre sui bordi degli specchi d'acqua.





Gallinella d'acqua



Gallinula chloropus - Common Moorhen

Rallide di medie dimensioni diffusissimo in Veneto. Il nome di gallinella d'acqua è legato anche al fatto che cerchi anche il cibo sui prati, soprattutto nei mesi invernali. A differenza della folaga non si immerge nell'acqua a meno di essere in forte pericolo. Maschi e femmine indistinguibili in natura.



Distribuita nelle parti pianeggianti e anche di collina del Veneto. Frequenta zone umide anche di piccola dimensione come fossati e canaletti, piccoli stagni.

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
[Green bar indicating presence throughout the year]											

Folaga



Fulica atra - Eurasian Coot


Rallide piuttosto grande dal piumaggio quasi completamente nero e becco bianco. Cerca la vegetazione acquatica della quale si nutre immergendosi. Come la gallinella d'acqua ha piedi lobati. Ha un richiamo molto breve ma caratteristico. Confidente nei luoghi protetti frequentati dall'uomo.



Adulto



Giovane



Presente in buona parte del Veneto, anche in zone montane che però abbandona in periodo invernale. Frequenta lagune, stagni, fiumi e canali di discrete dimensioni.



Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
[Green bar indicating presence]											

Age Group	Number of People
10-19	10
20-29	20
30-39	30
40-49	40
50-59	50




Zapornia parva - Little Crane

Piccolo rallide con maschi e femmine adulti diversi nel piumaggio. Si muove tra la vegetazione acquatica furtivamente e grazie alle piccole dimensioni non è facile individuarla. Ha lunghe dita che le consentono di camminare anche sulla vegetazione acquatica galleggiante.



Presente durante le migrazioni in Veneto nelle aree prevalentemente pianeggianti, con zone umide di acqua dolce o salmastra ricche di vegetazione ripariale e canneti.



Schiribilla grigiata



Zapornia pusilla - Baillon's Crane

Piccolo rallide molto simile alla congenere e più comune schiribilla. I maschi e le femmine sono di aspetto quasi identico e non si distinguono in natura. Si riconosce dalla schiribilla per assenza di rosso alla base del becco, segni bianchi ben diffusi sul dorso e barrature sui fianchi.




Foto G. Conca

Adulto



Del tutto accidentale in Veneto dove è stata osservata in pochissime occasioni in paludi e stagni ricchi di vegetazione ripariale.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Strolaga minore





Gavia stellata - Red-throated Loon

La strolaga più piccola, come le consimili si immerge in profondità nell'acqua per catturare le prede di cui si nutre. Ha un volo teso e veloce e si osserva in Veneto perlopiù con individui singoli. Maschio e femmina non distinguibili in natura.




fine macchiettatura bianca

becco
inclinato
verso l'alto



Presente nei mesi invernali e durante le migrazioni sia in mare sia nelle zone umide con acque sufficientemente profonde in lagune, laghi e anche corsi d'acqua, talvolta anche in ambiti urbani.







Strolaga maggiore




Gavia immer - Common Loon

La più grande strolaga, rarissima nel Veneto, si immerge a grandi profondità per cercare il cibo. In volo ha una silhouette che si può confondere con quella del cormorano, dal quale però si distingue dal sottoala bianco.



Osservata poche volte in Veneto soprattutto in mare, nelle grandi lagune aperte e sul lago di Garda.




Strolaga beccogiallo



Gavia adamsii - Yellow-billed Loon

Grande strolaga molto simile alla strolaga maggiore, anche come dimensioni. Del tutto accidentale in Veneto, è stata osservata in sosta al laghetto di Camazzole - Busa Giaretta (PD).

Foto Ryan Askren USGS
Alaska Science Center



strisce bianche



barratura evidente



**Individui in
inverno**

*becco rivolto
verso l'alto bianco
giallastro
nell'adulto*



Accidentale in Veneto, dove è stata osservata in sosta in un laghetto in una sola occasione.





Strolaga mezzana




Gavia arctica - Black-throated Loon

Strolaga di medie dimensioni che si riconosce dalla consimile strolaga minore per vari elementi, tra cui spiccano il pannello bianco sui fianchi e il becco diritto. Volta spesso bassa sull'acqua con un volo dritto e teso. Si immerge a discrete profondità.



Presente durante i mesi invernale in mare, sulle lagune e laghi del Veneto e anche talvolta in stagni di grandi dimensioni e con sufficiente profondità.




Berta maggiore



Calonectris diomedea - Scopoli's Shearwater

Una delle due berte regolari e nidificanti in Italia, ha abitudini strettamente pelagiche. Cerca il cibo volando sopra l'acqua con lente planate e virate per sfruttare le correnti d'aria sul mare.



In Veneto osservata poche volte esclusivamente in mare.


Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Berta grigia



Ardenna grisea - Sooty Shearwater

Specie rarissima in Veneto e in Italia. Ha abitudini simili alle altre berte e dimensioni circa intermedie tra la berta minore e la berta maggiore. Di marrone nelle parti inferiori del corpo e anche in buona parte del sottoala.



secondarie da lontano chiare

parti inferiori scure (anche in buona parte del sottoala)



Specie pelagica accidentale in Veneto, osservata in una sola occasione in mare.


Gen Feb Mar Apr Mag Giu **Lug** Ago Set Ott Nov Dic

Berta minore



Puffinus yelkouan - Mediterranean Shearwater

Specie piuttosto rara in Veneto. Tra le berte, tuttavia, è quella con il numero maggiore di osservazioni in Regione. Spesso forma piccoli gruppi che eccezionalmente possono anche arrivare fino a qualche centinaio di individui.



*gruppo in volo
sul mare*



Abbastanza rara esclusivamente in mare lungo le coste del Veneto.


Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Cicogna nera




Ciconia nigra - Black Stork

Cicogna ben più difficilmente osservabile in Veneto rispetto alla simile cicogna bianca. Ha un volo lento e piuttosto maestoso durante il quale come tutte le cicogne tiene il collo teso.



Osservabile in Veneto durante le migrazioni e qualche volta anche in periodo estivo, soprattutto con individui che transitano in volo. Quando sosta di solito usa campi coltivati con scarsa o bassa vegetazione.



Cicogna bianca



Ciconia ciconia - White Stork

La cicogna bianca è una specie molto conosciuta anche negli aneddoti popolari. Quando presente, è facile osservarla sia in volo sia posata. Si ciba di animali di piccole o medie dimensioni che cattura camminando in luoghi aperti.




*becco
completamente
rosso (il giovane
ha la punta
nerastra)*


*piumaggio bianco
e nero*

*ali bianche
anteriormente*

Adulto




Osservabile in Veneto in tutte le stagioni ma soprattutto durante la migrazione primaverili. In alcuni luoghi nidifica. Frequenta aree aperte con prati e incolti.





Morus bassanus - Northern Gannet

Grande uccello marino molto raro nel Veneto. Ha un corpo molto affusolato e per catturare le prede si tuffa da grandi altezze, immergendosi fino a vari metri sott'acqua. Difficile da osservare poiché ha abitudini strettamente marine.



Osservato in Veneto durante le migrazioni in mare lungo buona parte della costa.



Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Marangone minore




Microcarbo pygmaeus - Pygmy Cormorant

Il più piccolo tra i cormorani europei, ha becco corto e coda lunga e cuneiforme. Strettamente acquatico, nidifica in garzaie assieme ad aironi e altri cormorani. Si alimenta di piccoli animali, spesso pesci, che cattura immergendosi in acque poco profonde.



Distribuito come nidificante soprattutto in zone umide costiere ma recentemente anche nell'entroterra. Frequenta zone umide di acqua dolce o salmastra con presenza di arbusti o cespugli nei dintorni.





Marangone dal ciuffo



Gulosus aristotelis - European Shag

Molto simile al più comune cormorano, ha abitudini quasi esclusivamente marine. Ha forme più snelle e piccole del cormorano. In Veneto la specie non nidifica.



Frequenta ambienti perlopiù marini o anche di laguna aperta.
Estremamente raro nell'entroterra in stagni e laghi.



Cormorano





Phalacrocorax carbo - Great Cormorant

Il più grande tra i cormorani e uno dei più comuni assieme al marangone minore. È facile osservarlo quando su acque libere e aperte si immerge per pescare, talvolta in pesche collettive che coinvolgono anche gruppi composti da centinaia di individui.



gruppo durante una pesca collettiva



Distribuito come nidificante in molte zone umide della pianura Veneta, come svernante è ancora più diffuso. Frequenta acque di tutti i tipi (mare compreso) anche se di modeste dimensioni come piccoli canali.



Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
											

Mignattaio



Plegadis falcinellus - Glossy Ibis

Uccello acquatico di dimensioni medio grandi con piumaggio, nell'adulto, con riflessi brillanti. Ha un volo piuttosto lento e lineare durante il quale tiene il collo teso. Ha un lungo becco ricurvo verso il basso utile alla ricerca del cibo. Il nome comune deriva dalle mignatte (sanguisughe) che cattura.



Distribuito in Veneto lungo le zone umide d'acqua dolce costiere e alcune nell'entroterra. Nidifica anche in alcune colonie in associazione con ardeidi e cormorani.





Spatola




Platalea leucorodia - Eurasian Spoonbill

Molto grande, con piumaggio prevalentemente bianco e un becco a forma di spatola (da cui il nome). Si nutre in modo caratteristico con il becco semisommerso nell'acqua muovendo rapidamente il capo lateralmente e catturando piccoli animali acquatici, spesso piccoli pesci.



Molto localizzata come nidificante, amplia la sua distribuzione nei mesi invernali su stagni e lagune e valli da pesca litoranee. Durante le migrazioni presente anche in alcune aree dell'entroterra.




Ibis sacro



Threskiornis aethiopicus - African Sacred Ibis

Grande ibis dal piumaggio bianco e nero, becco nero e curvo verso il basso. Durante il volo tiene il collo teso. Specie gregaria, spesso nidifica assieme ad ardeidi e cormorani. Lo si può vedere mentre segue i trattori per trarre vantaggio nella ricerca del cibo (piccoli animali).



Specie alloctona presente ormai in molte parti del Veneto e in espansione negli ultimi anni. Nella cartina sono state riportate anche le colonie dove nidifica (Sighele et al. 2024). Frequenta zone umide di vario tipo e anche campi coltivati.


Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
[Green bar indicating presence throughout the year]											

Pellicano comune



Pelecanus onocrotalus - Great White Pelican

Grande uccello acquatico dal becco caratteristico dotato di una borsa di pelle elastica sulla mandibola inferiore. Rarissimo in tutto il Veneto e in Italia come migratore.




Adulto

borsa del becco
giallo ocr

ali inferiormente
nere nella parte
posteriore e alle
estremità e chiare
davanti



Del tutto accidentale in Veneto, osservato in pochissime occasioni presso grandi zone umide.



Pellicano rossiccio



Pelecanus rufescens - Pink-backed Pelican

Molto simile agli altri pellicani europei, si riconosce per una macchia nera davanti all'occhio. Nei giovani, piumaggi grigiastri poco appariscenti. Da vicino il becco mostra fini "costolature".




Foto F. Zanatta



Foto A. Barbon & F. Zanatta



Del tutto accidentale in Veneto, dove è stato osservato in una sola occasione nei pressi del fiume Piave a Papadopoli.


Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Tarabuso




Botaurus stellaris - Eurasian Bittern

Grande airone di dimensioni compatte e dalla colorazione estremamente mimetica che lo aiuta a nascondersi nel suo habitat. Molto raro in inverno; occasionale e difficile da rilevare durante la nidificazione. Il suo canto, simile ad un muggito, spesso è confuso con quello della rana toro.



Presente soprattutto nei mesi invernali. Distribuito in molte zone umide con canneti o ricca vegetazione ripariale, in buona parte delle aree planiziali del Veneto. Molto localizzato come possibile nidificante.



Tarabusino



Botaurus minutus - Little Bittern

Il più piccolo airone europeo, in dialetto veneziano chiamato trentacoste per via della sua esilità. La femmina è molto mimetica mentre il maschio è leggermente più appariscente e di colore nero e beige-crema. Emette un tipico canto simile ad un debole e roco abbaiare di cane, ripetuto.

Maschio



Femmina


marrone



Giovane



ali striate di
marrone





Presente in primavera-estate nel Veneto in aree pianeggianti, con presenza di zone umide d'acqua dolce o salmastra con canneti e altra vegetazione ripariale.






Egretta gularis - Western Reef Heron

Airone di dimensioni simili alla garzetta dalla quale si distingue solo per il piumaggio in buona parte grigio scuro. Esiste anche una forma chiara con piumaggio prevalentemente bianco, talvolta macchiettato di grigio. Il becco ha colorazione variabile dal nero all'arancione.





Molto raro in Veneto, dove è stato osservato in aree della laguna di Venezia, sul lago di Garda e nel delta del Po, soprattutto in tarda estate.





Egretta garzetta - Little Egret

Airone di media grandezza tra i più diffusi e facilmente osservabile in Veneto. Cerca il cibo camminando in acque basse, effettuando talvolta brevi corse improvvise. Altre volte si apposta aspettando che le prede, soprattutto pesci, gli vengano a tiro.



Diffuso tutto l'anno in Veneto, in aree pianeggianti, con presenza di zone umide d'acqua dolce o salmastra, anche canali, fossati, fiumi e campi.



Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
[Green bar indicating presence throughout the year]											

Nitticora



Nycticorax nycticorax - Black-crowned Night Heron

Airone di abitudini soprattutto notturne, usa un richiamo tipo “quack” emesso spesso in volo. Nidifica in garzaie come molti altri aironi. D’inverno si raduna presso pochi luoghi adatti assieme ai suoi conspecifici. Ha occhi grandi adatti a vedere nell’oscurità.



Ben distribuita anche come nidificante in buona parte delle aree pianeggianti e anche di collina del Veneto. Frequenta stagni, corsi d’acqua e valli da pesca con vegetazione ripariale arbustiva che usa per la ricerca del cibo.




Sgarza ciuffetto



Ardeola ralloides - Squacco Heron


Airone di medie dimensioni che di solito si osserva con individui singoli in alimentazione, spesso sopra vegetazione galleggiante (ninfee o altre piante acquatiche). Il suo verso più usato è una specie di "squacc".



**Adulto in
abito**

*becco azzurro e
nero in punta*


*ali in buona parte
bianche che si notano
soprattutto in volo*



**Adulto in
abito non
riproduttivo**



**Immaturo o
adulto in
inverno**



Presente come nidificante nelle zone umide di pianura, specialmente costiere (valli da pesca, stagni). È una specie migratrice ed estiva in Veneto.





Airone bianco maggiore




Ardea alba - Great Egret

Il più grande e slanciato degli aironi. Spesso si osserva con individui isolati, soprattutto nei mesi invernali. Si alimenta spesso anche sui campi coltivati e nelle scoline. Quando disturbato si invola spesso emettendo un particolare verso.



Presente in molte aree di pianura e alcune collinari del Veneto, soprattutto nei mesi invernali. Molto localizzato con poche coppie come nidificante. Frequenta sia aree aperte che stagni, paludi, aree lagunari e campi.



Airone guardabuoi



Ardea ibis - Western Cattle Egret

L'airone guardabuoi ricerca il cibo camminando e facendo movimenti caratteristici con il capo. Si nutre di invertebrati e piccoli vertebrati. In inverno dorme in gruppo assieme ad altri aironi e cormorani. In primavera-estate nidifica in gruppi nelle garzaie.



Distribuito anche come nidificante soprattutto nelle zone umide planiziali del Veneto; evita le quote più alte. Soffre molto in inverno per il freddo intenso che rende difficoltoso il reperimento del cibo. Frequenta spesso la campagna coltivata.


Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Airone rosso



Ardea purpurea - Purple Heron

L'airone rosso presenta un piumaggio molto mimetico che lo rende difficile da individuare nei canneti o tra la vegetazione ripariale dove abitualmente ricerca il cibo. Spesso si individua solo al momento dell'involto, anche se vicino.



Distribuito come nidificante in molte aree pianeggianti del Veneto con zone umide ricche di vegetazione; come migratore è osservabile in altre aree dell'entroterra, talvolta a quote collinari.





Airone cenerino



Ardea cinerea - Grey Heron

L'airone cenerino è uno dei più comuni e diffusi aironi nel Veneto, arrivando a nidificare anche in montagna. Di norma sta alla ricerca di cibo in aree aperte, dimostrandosi a volte confidente con l'uomo. Riesce a catturare anche prede di notevoli dimensioni.



Distribuito in tutto il Veneto anche come nidificante. Frequenta campi e zone umide di vario tipo, come lagune, valli da pesca, stagni, fiumi, canali, fossati.

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
											

Bibliografia:

AviList checklist 2025. <https://www.avilist.org/>

Sighele M., Scarton F., Verza E., Stival E., Cassol M., Maistri R., Mezzavilla F., Peruzzo J., Piras G., Sartori A., Sighele G., Utmar P., Valle R.G., Volcan G., 2024. Risultati del censimento delle specie coloniali (Threskiornithidae – Ardeidae – Phalacrocoracidae) nidificanti nel Triveneto (Veneto, province di Trento e Bolzano, Friuli-Venezia Giulia). Anno 2023. Birding Veneto, www.birdingveneto.eu/garzaie/index.html

Stival E. & Sighele M., 2019. Atlante FotoSonoro degli Uccelli del Veneto ed. 2019. <https://www.birdingveneto.eu/atlasven2019/>

Indice delle specie

Airone bianco maggiore	86	Moretta grigia	38
Airone cenerino	89	Moretta tabaccata	34
Airone guardabuoi	87	Moriglione	35
Airone rosso	88	Nitticora	84
Airone schistaceo	82	Oca collarosso	13
Alzavola	46	Oca colombaccio	12
Anatra mandarina	21	Oca del Canada	14
Berta grigia	67	Oca delle nevi	16
Berta maggiore	66	Oca egiziana	22
Berta minore	68	Oca facciabianca	15
Canapiglia	42	Oca granaiola della tundra	20
Casarca	24	Oca lombardella	19
Cicogna bianca	70	Oca lombardella minore	18
Cicogna nera	69	Oca selvatica	17
Cigno minore	10	Orchetto marino	27
Cigno nero	9	Orco marino	28
Cigno reale	8	Pellicano comune	78
Cigno selvatico	11	Pellicano rossiccio	79
Codone	45	Pesciaiola	30
Cormorano	74	Porciglione	55
Edredone	26	Quattrocchi	29
Fenicottero	48	Re di quaglie	56
Fenicottero minore	47	Schiribilla	60
Fischione	43	Schiribilla grigiata	61
Fistione turco	33	Sgarza ciuffetto	85
Folaga	59	Smergo maggiore	32
Gallinella d'acqua	58	Smergo minore	31
Garzetta	83	Spatola	76
Germano reale	44	Strolaga beccogiallo	64
Gobbo della Giamaica	7	Strolaga maggiore	63
Gobbo rugginoso	6	Strolaga mezzana	65
Gru	54	Strolaga minore	62
Ibis sacro	77	Sula	71
Marangone dal ciuffo	73	Svasso collarosso	51
Marangone minore	72	Svasso cornuto	50
Marzaiola	39	Svasso maggiore	52
Marzaiola americana	40	Svasso piccolo	53
Mestolone	41	Tarabusino	81
Mignattaio	75	Tarabuso	80
Moretta	37	Tuffetto	49
Moretta codona	25	Volpoca	23
Moretta dal collare	36	Voltolino	57



Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

www.veneziabirdwatching.eu